

上海旺园家禽养殖专业合作社

以人为本，以德为先
创建国内一流的家禽科技企业

地址：奉贤区奉城镇卫季村 1248 号
联系电话：021-64782653
手机：13501709376 13901659483



[教你一招]



养貂增效四要点

选好种貂

养好貂主要是皮值钱,那么就要选毛皮光亮、背腹毛色一致,针毛较短,毛峰、绒毛齐平,密度大,分布均匀,毛柔软,强性好,真毛略长于绒毛,紫貂无白针毛,白斑,这样的貂皮质量好才能卖上高价。

抓好配种期

饲养管理水貂每年繁殖一次,都是在每年的 2 月至 3 月发情配种。所以种貂在 1 月下旬就要进行配种预备期的管理,特别对配种期的种公貂要保证供给优质的精饲料,如新鲜的血、蛋、奶、肝、鱼等动物性饲料,应占 80%以上。还要增加滋阴壮阳药物,如六味地黄丸、淫羊藿和维生素 E、B、C 等,坚决杜绝近亲交配,防止貂的退化。对于种母貂妊娠后期也要保证供给优质的饲料,尤其在屠宰动物喂养时,一定要摘除肾上腺脑垂体等含有性激素的器官,以免母貂食后会造成死胎和流产。

确保仔貂成活率

仔貂出生后,必须放在产仔箱里,而且上下两侧要放有热水袋保温,同时,必须保证仔貂吃上初乳,在产房母貂产仔时,要保持周围安静的环境。在仔貂长到最快时期 7~8 月份,那时气温高,空气湿度大,这个季节容易发生疾病,要给貂喂新鲜的车前子、蒲公英等草药。这样可降低饲料成本,又预防了貂肠道疾病的发生。

搞好防疫和换毛期管理

在每年的 6~7 月份就要给貂接种犬瘟热、副伤寒和巴氏杆菌疫苗防止传染病的发生。到秋分时节,水貂就进入了换毛期,这是个提高毛皮质量关键时期,除喂给优质的饲料外,在饲料中要加入植物油如豆油和花生油等,还要进行补给维生素 B2,每只每日应补给 10 毫克。

张艳华

[生猪行情]

肉猪价格(元/公斤)

闵行区:15.0
嘉定区:15.2
浦东新区:15.2-15.7
奉贤区:15.2
金山区:15.4
崇明县:15.0
长宁区:15.0

(本期是 2012 年 9 月 28 日所采的价格。)

沪郊毗邻地区苗猪交易价(元/公斤)

嘉定区:30.0
浦东新区:26.0-28.0
奉贤区:24.0

(本栏目信息由上海市生猪行业协会提供)

本版由上海市生猪行业协会协办

积极推动科学养殖方式的应用

“健康养殖”成为我国畜牧业首要目标

由中国畜牧兽医报主办的首届中国畜牧业健康发展研讨会,近日在内蒙古自治区呼和浩特市召开。农业部、业内知名专家、企业代表共话我国畜牧产业发展,将“健康养殖理念”作为主要议题。

近年来,我国畜牧业在数量上快速增长。其中,2011 年总产值超过 2.2 万亿元,创历史新高。但我国畜牧业却存在“大而不强”的尴尬。目前频发的食品安全事件,许多都与畜产品有关,推行健康养殖理念刻不容缓。

饲料作为畜牧产业链的上游环节,因为市场潜力巨大,近年日益受到关注。据农业部畜牧业司有关负责人介绍,“十二五”期间,我国平均每年增加 800 万吨饲料供给,才能满足国内需求。全国畜牧总站饲料评审处处长王黎文指出,我国饲料供给现处于紧平衡状态,导致养殖成本上升,已出现短缺的前兆。今后,随着畜牧业的发展,饲料供给将出现进一步紧张的局面。畜牧业的持续健康发展离不开饲料原料的稳定供给,面对有限资源的制约,只有通过

发展新技术实现开源节流。

养殖技术的创新与推广成为此次研讨会上与会专家关注的焦点,包括生物农牧业、乳酸菌在畜牧业中的应用、蛋鸡散养体系等,其中永业动物生命素也为解决畜禽养殖中滥用抗生素的问题提供了方法。与会代表指出,我国畜牧产业在发展过程中要有选择地学习国外的先进经验,不要过分追求产量增长,而应积极推动科学养殖方式的应用。

胡玫

长途运雏注意事项

长途运雏是一项细致而又辛苦的技术工作,要求迅速、舒适、安全、卫生、健康的完成。因此,对运雏工作要有足够的重视与认识,采取认真严谨的科学态度,挑选责任心强并有一定专业知识和经验的人员担任运雏管理工作,才能保证运雏工作的圆满完成。

●车辆及器具的选择

长途运雏最好选择带有通风装置或冷暖空调的改装客车或运货卡车,以保证将雏鸡散发的大量热量排散出去,同时无论冬夏均能给雏鸡以舒适的温度。

运雏最好选择专用的优质雏鸡包装盒,四周及上盖打有若干个直径为 2 厘米的通风孔,盒的长、宽、高尺寸合适,肉种鸡盒要比蛋种鸡盒略大,内分 4 格,底部铺防滑纸垫,每格放 20—25 只雏鸡,炎热的夏季可每格放 20 只,每盒装 80 只,其它季节每格放 25 只,每盒装 100 只。这样既有利于保温和通风,还可以避免鸡雏在盒内相互践踏或摇荡不安。

●运雏前的准备

对运雏所用的车辆、包装盒、工具以及运雏需要的服装、鞋帽等进行认真彻底的清洗和消毒。安排的押运雏鸡人员要了解雏鸡习性、运雏经验丰富。装车前要认真清点雏鸡数量、检查雏鸡质量并将车厢内温度调至 25—28℃,车厢底部铺上利于通风的板条之类的装置,装车时将鸡盒按顺序码放,鸡盒与车厢体之间、鸡盒的排与排之间一定要留有空隙,同时留出人员能够进出的过道,以便路途上观察雏鸡状态并根据状态调整车内温度和鸡盒位置。

●运雏时间的安排

运雏的适宜时间要求是越早越好,一般在雏鸡绒毛干燥可以站立至出壳后 36 小时前这段时间为佳,最好不要超过 48 小时。如果由于路途遥远,36 小时之内不能运抵目的地,应中途给雏鸡补水。根据天气情况安排运雏时间,如炎热天气选在傍晚装运,次日早晨到达,避免高温给雏鸡带来更大应激。

●途中应注意的事项

车辆运行要平稳,尽量避免颠簸、急刹车、急转弯;启动和停车时,速度宜缓慢,以利于雏鸡适应车速的变化;上下坡宜慢行,以利于雏鸡保持重心,避免挤到一起而造成损伤;路面不平时宜缓慢,避免因速度快而加大震动;在平直和车辆较少的路段,应尽量快些。

途中尽量减少停留时间,两个司机昼夜轮流开车,交替吃饭。押运人员时刻注意雏鸡情况,听到雏鸡异常叫声时赶紧检查是何种原因造成并及时调整。半小时左右开灯观察雏鸡表现,将手伸进盒内感觉是否过热,雏鸡身上是否有水汽,或用温度计插入鸡盒通气孔内,刻度留在盒外,随时检查盒内温度并及时调整车内温度。避免雏鸡受热、受闷、受风、受寒。

如见雏鸡张嘴抬头、绒毛潮湿,多是温度过高或缺氧,这时要扩大通风孔和降温,同时结合倒盒的方法使温度降下来。如见雏鸡挤成



一堆,盒底潮湿,多是温度过低,这时要赶快加盖床单或棉被(但不能盖的太严,以防雏鸡因缺氧而窒息)保温、加温使温度上升。

●到达育雏场地

雏鸡到达目的地,应对车体消毒后再进入场内。卸车过程速度要快、动作要轻、稳并注意防风 and 防寒。如果是种鸡,应根据性别、性别分别放入各自的育雏舍,做好隔离。打开盒盖,检查雏鸡状况,核实数量,填写运雏交接单。

总之,只要按照以上运雏的基本原则,做到迅速及时、舒适安全并注意卫生防疫,均可顺利完成运雏工作。我公司运雏人员对此工作一直非常重视,因工作出色多次受到公司表彰。

王粉红

[链接]

雏鸡通风换气的要求

雏鸡新陈代谢旺盛,单位体重所需的新鲜空气和呼出的二氧化碳及水蒸气量多,鸡粪中还不不停地释放出氨气。不良的舍内环境因素,将给鸡只带来应激,影响鸡只的正常活动,影响机体的生长发育,降低机体免疫功能,增加机体疾病感染几率,使鸡生长发育不同程度地受阻。所以育雏室应特别注意通风换气。

育雏室通风换气与保温是一对矛盾,解决这一矛盾的有效办法就是:早春、晚秋和冬季,由于空气寒冷而又缺乏通风设备时,

可在鸡吃料时进行,由于鸡群正在吃料,处于活动状态中,这时舍温下降 2℃~4℃对鸡体基本无妨碍,但是要避免直面风吹。等待鸡群吃完料,鸡群中有 2/3 数量的鸡开始或正在饮水时,再关闭窗户。严禁鸡休息时开窗通风。否则,鸡容易发生感冒,或者因此诱发呼吸道疾病。通风和保温常常是一对矛盾问题对立。要解决好这一对矛盾问题,最好的办法是在房顶设置天窗,或者在房檐下高窗部位安装换气扇。

中禽

[实用技术]

散养蛋鸡秋季高产措施

致后期产蛋率低。

(3)尽量饲喂全价蛋鸡饲料。

尽管玉米、麦麸是很好的饲料原料,却缺乏蛋白质、钙和磷,即使散养蛋鸡能从土壤中获得一些矿物质,但由于很多地区土壤中矿物质含量少,不能满足需求。如果给蛋鸡饲喂由玉米、麦麸、豆饼、骨粉、食盐、贝壳,以及由氨基酸、微量元素和维生素组成的配合饲料,则能保证蛋鸡充足的营养,既可满足其体重发育、产蛋需求,又可避免发生营养缺乏症,如啄羽、瘫痪等。此外,一些蛋鸡散养户误认为饲料贵,饲喂玉米便宜。其实不然,玉米价格与蛋鸡配合饲料价格相当,饲喂玉米并不能降低成本。

京郊

鸽子饲料的搭配

能量饲料 能量饲料称碳水化合物饲料,以禾本科作物种子为主,有玉米、稻谷、小麦、大麦、高粱、小米等。

矿物质饲料 矿物质饲料含有多多种矿物质微量元素,有红土、细砂、贝壳粉、石膏、旧石灰、食盐、骨粉、蛋壳粉、木炭等,均以小量合成制作保健沙。

维生素饲料 维生素来源于青饲料,只要没毒性和异味的都可切碎后给鸽子食用,如夏天用西瓜皮与马齿苋作青饲料,可抗病、防病。

在常用饲料中,玉米含能量较高,其主要成分:含淀粉 70%左右,而且消化率高达 90%,含脂肪 45%,蛋白质 9%左右。但是玉米胶蛋白质较差,缺乏钙质、赖氨酸

和色氨酸,不能单独作肉鸽的日粮,必须适当搭配品质优良的蛋白质饲料和其他谷物。稻谷:作为鸽的主要饲料,效果次于玉米。其主要成分:含淀粉 60%左右,蛋白质 9.3%,脂肪 1.4%。营养成分较好,但适口性较差,最好加工成糙米。小麦含淀粉 70%左右,蛋白质 11%,脂肪 2%。维生素 B 族含量丰富。但小麦多吃了会拉稀,不能作主食,应与其他谷物配合饲喂。高粱:营养价值与玉米相似,粗蛋白含量 9.5%,但适口性较差,能止泻,多吃会引起便秘。如以麦类为主食,搭配适量的高粱,能防止拉稀又不会便秘,两者起互补作用。小米含较多胡萝卜素,营养价值较高。

中畜