


上海旺园家禽养殖专业合作社

以人为本，以德为先
创建国内一流的家禽科技企业

地址：奉贤区奉城镇卫季村 1154 号

联系电话：021-57175121

手机：13901659483



如何辨别低产蛋鸡

从鸡叫声上辨别
高产鸡:叫声洪亮整齐均匀。
低产鸡:不叫、放哨,发现异常动物和其他小动物到鸡场,立刻大叫造成大群惊吓,产软壳蛋。

从鸡冠上辨别
高产鸡:鸡冠红大、柔软、细腻、倒向一侧、正常红色。
低产鸡甚至不产蛋的鸡:鸡冠立起不倒、有白点或白霜、冠薄;如果患有马立克氏病,鸡冠萎缩、没有温度、冠凉;若有紫冠、黑冠的鸡要及时淘汰。

从羽毛上辨别
高产鸡的羽毛土色、蓬乱、不油亮、不光滑,颈部、背部、胸部、有羽毛脱落或掉光。

从腿嘴上辨别
高产鸡:褪色越明显,产蛋率越高。
低产鸡:250~300 日龄的鸡腿、鸡嘴仍然是黄色。

从肛门上辨别
高产鸡:肛门阔约肌松弛,挤压阔约肌周围富有弹性,有湿润感,并立即收缩,流出粘性分泌物。
低产鸡:肛门缩紧、周围肌腹挤压无弹性,无湿润感。

从粪便上辨别
高产鸡:粪便成形,形状成小头带白色,夏季喝水多一些,基本成型,颜色正常。
低产鸡及不产蛋的母鸡:粪便细长,干粪便较多。

从采食情况上辨别
高产鸡:饲喂时如饿虎扑食,狼吞虎咽、食欲旺盛,吃时不抬头、不挑食、迅速吃净。
低产鸡:挑食不爱吃,甚至将饲料啄成一堆不吃,又浪费饲料。

从腹部上辨别
高产鸡:腹部宽大。
低产鸡:腹部窄小、瘦弱、胸骨尖似刀刃。

[生猪行情]

肉猪价格(元/公斤)
闵行区:15.2
嘉定区:14.8
浦东新区:14.8-15.2
奉贤区:14.3-14.8
金山区:14.8
崇明县:15.2
长宁区:15.0
(本期是 2013 年 6 月 28 日所采的价格。)

沪郊毗邻地区苗猪交易价(元/公斤)
嘉定区:29.0
浦东新区:24.0-26.0
奉贤区:24.0
(本栏目信息由上海市生猪业行业协会提供)

本版由上海市生猪业行业协会协办

加强质量监管

婴幼儿配方乳粉生产“五不准”

日前,食品药品监督管理总局、工业和信息化部、公安部、农业部、商务部、卫生计生委、海关总署、工商总局、质检总局九部委联合下发了《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》。根据《意见》,婴幼儿配方乳粉质量安全监管全面升级,将参照药品管理办法严格管理,生产过程严格执行五个不准:不准委托加工,不准贴牌生产,不准分装生产,不准用同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉,不准使用牛、羊乳(粉)以外的原料乳(粉)生产

婴幼儿配方乳粉。

《意见》规定,婴幼儿配方乳粉生产企业须具备自建自控奶源,对原料乳粉和乳清粉等实施批批检验,确保原料乳(粉)质量合格。落实企业首负责任。奶畜养殖者和奶站要全面落实乳品质量安全制度,严格饲料、兽药的科学使用和管理。奶站和婴幼儿配方乳粉企业要严格执行生鲜乳收购、贮存、运输制度和不合格生鲜乳主动报告及无害化处理制度。

参与《意见》起草的农业部畜牧业司相关

炎热夏季猪场饲养管理应对

众所周知,猪是恒温动物,其调节体温的能力较差,仔猪怕冷而成猪怕热。各类猪群适宜的环境温度为:公猪 13~19℃,后备公猪及母猪 14~20℃,妊娠前期母猪 13~19℃,妊娠后期母猪 16~20℃,分娩及哺乳母猪 16~20℃,哺乳仔猪 26~35℃,保育猪 18~25℃,生长猪 18~20℃,育肥猪 16~18℃。高温会造成猪群采食量低、公猪精液质量下降、配种分娩率低、出生重低、泌乳量低、料肉比高、生长速度慢等不良反应。为提高猪场的经济效益,降低热应激带来的负面影响,可采取如下措施。

●饲养管理方面

- 1)调整喂料时间。生猪喂料的时间,应在早晨和傍晚天气凉爽时,尽量避开高温时段。分娩母猪采用 4 次加料(晚上 10:00—11:00 增加 1 次喂料)。其他车间可在现有基础上追加 1 次投料,时间是早晨 6:00,上午 10:30,下午 16:30,晚饭后 19:00。妊娠种猪早晨 6:00、晚饭后 19:00 为好。
- 2)采用湿料饲喂。湿喂的优点:①适口性强;②节省饲料;③节省用水——减少饮水次数、污水排放及防止饮水器滴水损失;④增加采食量;⑤饲料成本低——可用饲料原料范围大;⑥生产性能和饲料转化率高—改善增重速度,特别是对体重较轻的仔猪。对于母猪不但能增加采食量、提高分娩率、增加产仔数、增加产奶量,还能增加仔猪存活率(多存活 0.3~0.4 头)。
- ⑦改善猪舍环境,减少饲喂时空气中的饲料粉尘、从而减少呼吸系统疾病的发生。饲喂湿拌料时应注意的事项:①维持湿料的新鲜,保持不酸败;②保持水槽的清洁卫生,避免感染微生物——造成仔猪下痢,影响适口性;③注意饲喂次数、供水量;④湿拌料要现拌现用。
- 3)每次喂料时,认真观察猪群采食情况,料槽不能有过多剩余料,防止剩余的饲料发生霉变,及时清除粪便污染料槽的饲料。
- 4)给生猪补充青绿多汁牧草饲料,可以消暑降温,预防生猪发生便秘。

●卫生方面

- 1)及时清除车间粪便,减少氨气味的发

生,减少蚊蝇滋生的场所。

- 2)母猪栏舍应及时清理粪便,打扫干净,每天可以冲洗 1 次。避免粪便污水污染猪体,引起乳房及产道感染发炎。
- 3)哺乳母猪应及时清扫粪便,擦洗乳头,必要时应该擦拭产床。防止粪便污染乳头,引起仔猪下痢。

●设备设施利用

- 水帘、淋浴等降温设备、设施要保证正常使用。母猪主要通过 4 个途径来散热:传导、对流、辐射和蒸发。目前,许多猪场采用水帘来为母猪降温。下面简要地介绍一下使用水帘、淋浴应注意的事项。
- 1)经常检查电器件及线路是否完好无损,确保安全用电。
 - 2)猪舍温度高于 25℃时,应开启水帘、风机、淋浴。
 - 3)开启水帘、风机之前,应关闭门窗包括地窗,确保舍外空气经水帘进入猪舍内。
 - 4)水帘开启后,调节蓄水池供水管的水流量,既要保证供水充足,又不至于水溢出池外,做到节约用水。
 - 5)水帘使用过程中应经常巡视,保证水泵、风机正常运转。发现异常,应马上切断电源,通知维修工进行维修。
 - 6)蓄水池储存的水要保持清洁,以免堵塞水帘喷水口喷水。影响水帘效果。
 - 7)车间温度高于 25℃时开启淋浴给猪洗澡,开 10 分钟停 30 分钟。

●其他管理措施

[家禽园地]

种蛋的挑选法

形状正常。正常蛋为卵圆形,蛋形指数在 0.72-0.76 之间。过长、过圆、两头尖、中间大或一头特大一头特小等蛋均不能选用。

种蛋来源。种蛋必须来自高产、健康无病、饲养管理正确、配偶比例适当的种鸡群,才能保证较高的受精率和孵化率。

内部品质要好。种蛋内部品质可用灯光照检,凡粘壳、散黄、蛋黄流动性大,蛋内有气泡,气室偏,气室流动,气室在中间或在小头的蛋,均不宜使用。

种蛋要新鲜。用来孵化的种蛋愈新鲜愈好。随着保存时间的延长,种蛋孵化率会逐渐降低。

种蛋不能用水洗,经水洗过的蛋表面胶质脱落,微生物容易侵入内部造成变质,蛋内水分也易蒸发。

蛋的剖检。每批可随机抽出几个种蛋,将蛋打开放入平玻璃容器中,新鲜的蛋白较浓,蛋黄隆起,不新鲜的蛋白稀薄,蛋黄相对较扁平。

种蛋大小。种蛋大小要适中,过大或过小的蛋都不能用。一般蛋用型鸡种蛋重:开产后的前 12 周为 52 克,以后为 55 克以上;肉用型鸡种蛋重:前 12 周 50 克,12 周后为 52 克以上,无论是蛋用型还是肉用型都不能超过 65 克。

中禽



- 1)降低饲养密度、充分利用圈舍装猪特别是保育、生长、其中育肥 10~11 头为好。
- 2)转群避开高温天气,时间以早晨 530~7:00 为宜。
- 3)配种、查情时间安排早晚凉爽时候进行。
- 4)分娩车间白天诱导分娩,可给 2/3 的猪注射氯前列烯醇,其余 1/3 的猪则可于晚上分娩。
- 5)为提高分娩率,缩短发情间隔、降低子宫炎发生,断奶当天给母猪注射氯前列烯醇 2mL。
- 6)各栋车间备用抗热应激药物氯丙嗪、硫酸镁针剂、维生素 C 等。
- 7)夏天母猪产程长、助产次数多,特别是高胎龄的母猪,为降低子宫炎的发生,产完后后阴部散洒抗生素粉杀菌干燥消毒,减少蝇虫叮咬。
- 8)公猪舍增加空调及淋浴。气温高于 25℃开启空调,空调设置温度为 20℃。
- 9)种猪妊娠车间、公猪车间中午实行降温轮流值班制度。
- 10)晚上增加降温人员,负责降温、配合接产、分娩车间加料等工作。
- 11)9 月份外界湿度大的情况下、使用水帘效果差,舍内温度降不下去,应配合地窗对流降温及风机通风。通风使舍内空气流动,能把猪体热量带走起到降温作用。
- 12)生长育肥车间温度高于 32℃以上时,对圈舍和猪体进行冲洗。

曾玉露

蛋鸡体重控制

适时调整饲料供给和制定换料时间,使鸡群始终处于适宜的体重状态。

适时分群、合理调群。无论养鸡技术、管理水平多高,鸡群中总会出现一些体质较弱的鸡,如果不能及时挑出,进行个别处理,势必影响鸡只的生长,影响大群的均匀度和合格率。

适当补饲。如果在育成期体重不能达到标准可采取间歇性油脂饲喂法来增加体重,每吨料添加 10~20 千克植物油搅拌均匀,饲喂 7 天、停 7 天,如果不够再喂 7 天、停 7 天,采取此方法时,要注意,及时称体重和关注胫骨长,防止出现小胖鸡。

中禽