



上海丰羨实业有限公司

宝杨路1858弄15号601室 电话:021-61532137 66867462 13816062477 联系人:黄先生

来自海上的香格里拉（横沙岛）的产品
系列饮料：芦粟汁，橙汁；绿色农产品生产与销售，农家乐休闲旅游等。**诚招代理商**

三农实用周刊



母羊乳房通风法怎么操作？

问：母羊产后瘫痪治疗中有一种乳房通风法,怎么操作？
答：母羊产后瘫痪的成因尚不太清楚，在发生母羊瘫痪时可以用乳房通风法进行治疗，既简单又有效。方法是:将乳头用水洗干净后,用75%酒精消毒,再将乳汁挤干净,然后插入经过消毒的乳导管，基部垫几层消毒纱布,接上打气筒,慢慢打入空气,使得乳房充满空气。见皮肤紧张，用手指弹击呈鼓响时停止注入空气,并拔出乳导管,用纱布轻轻缚住乳头,不使空气逸出。一般过15分钟到20分钟后揭开纱布，母羊瘫痪及全身症状就会有明显好转,多数病羊在2-4小时后即能站立。若不见好转，必要时间隔5-6小时再进行一次。乳房通风法只是治疗手段之一，同时要配合其他治疗方法和积极的护理。

小葱葱梢弯下、变黄，怎么办？

问：小葱种下去2个月左右，但葱梢不往上生长,而是弯下去且变黄,该怎么办？
答：由于前2个月上海持续高温干旱，如管理不当很容易出现“葱梢不往上生长，而是弯下去且变黄”的现象,这是正常的。小葱其实很好种，一般的土壤都能种,种前亩施腐熟有机肥3000kg、复合肥40kg作基肥，追肥用0.5%尿素稀肥水即可。管理的重点是水分和温度。葱类喜欢温暖、半阴、凉爽、通风、湿润的环境,适宜生长温度为12℃至25℃。其根系分布较浅,吸收力较弱，不耐旱、涝,因此必须小水勤浇,保持土壤湿润,并注意多雨时及时排除积水。
高温干燥季节,应早晚各浇水1次,水量不宜过多,同时要搭建荫棚、遮阳防晒。9月中旬至11月为葱的生长适宜期,只要注意水分管理,保持湿润,马上就会恢复生长。

上海三农服务热线供稿

遗失公告
▲上海广园汽车摩托车配件有限公司遗失企业法人营业执照正副本各一本，注册号为3101151504503，企业标识为150000011995071900077,声明作废。

注销公告
上海广园汽车摩托车配件有限公司经股东会议决议，即日起注销,特此公告。

秋季鱼塘加水“五讲究”

在鱼类养殖过程中，养殖户常常会碰到一些问题需要给鱼塘加水，这是调节水质的有效措施。加强水质调控，是夺取池鱼优质、高产的必要保证。为达到理想的效果，在加水过程中应注意以下几点：

- 适时加水** 把握好加水时间，加水要根据天气变化、气温高低、水质情况灵活掌握：养殖普通鱼类，一般每隔7天左右向池塘加水1次。如天气酷热、温度高、水质过肥，或阴雨、闷热天，加水的间隔时间应缩短。
- 清晨加水** 给鱼池加水，最好选择在清晨进行。因为夜间池水中浮游植物光合作用停止，水体中各类生物的呼吸还须耗氧，至清晨3-5时会降到最低值。所以，选择清晨给鱼池注入新水，增氧效果明显。鱼池白天一般不宜加水，因为白天池水中浮游植物光


- 合作用旺盛，水中溶氧充足，此时加水不但不能增氧，反而会使水中溶氧逸出。
- 科学加水** 给鱼池加水，必须满足以下要求：注入的水必须清新、无污染、溶氧充足且温差不要过大，一般鱼苗池温差不超过2℃，鱼种池温差不超过5℃；抽水时应抽取水源上层水。一般将抽水管插入水面下30厘米左右，这样的浅层水有机质含量低、溶氧含量高、水温与池水温度相近，注入池塘后会有利于鱼的生长发育；加水前应排出池塘底层部分原池水，然后注入新水，并且进水口用密眼网过滤，严防野杂鱼、敌害生物进

蘑菇淋雨后菇体发黄怎么办？

来自宝山区的张女士致电上海三农服务热线，称她种的蘑菇受台风影响淋了透雨，菇体发黄该怎么办？

- 针对此问题，热线专家表示，蘑菇的菇体发黄，主要是因为菇棚漏雨。台风雨量大，蘑菇的培养料受雨水的影响，料内的含水量过高，造成蘑菇的菌丝窒息，使得菌丝萎缩（俗称“退菌”），影响了料内养分向菇体输送，最后导致菇体发黄，逐渐软蔫死亡。菇农称：“蘑菇菌丝干不死，湿要死”，就是这个道理。
- 建议采取以下措施：**

- 1、将黄萎的蘑菇及时摘除，防止其在菇床上腐烂而造成杂菌污染；
- 2、及时开启门窗，进行菇房大通风，地面撒干石灰粉，尽快把菇房的湿度降下来，营造良好的干燥环境；
- 3、及时进行料内打扞，用竹扞从培养料底自下而上打扞，并摇动，使料内的洞穴呈下面口大上面口小的圆锥形。每隔6-8厘米打一个洞，呈梅花形分布。



经过以上处理，4-5天后，蘑菇菌丝会快速恢复，长出新生的绒毛菌丝。

上海三农服务热线供稿

贵宾犬的怀孕期是多少天？

来自崇明县的樊先生致电上海三农服务热线，说他家有只贵宾犬在发情第二天配的种，询问其怀孕期是多少天？

- 针对此问题，热线专家表示，犬一年有两次发情，通常在春季3-5月和秋季9-11月。可将发情周期分为4个阶段。
- 发情前期** 一般为7-10天，是发情的准备阶段。主要表现是分泌增加，外阴部充血，阴户肿胀，阴道流出混有血液的黏液，并烦躁不安，排尿频繁，但母犬不允许公犬交配。如果在这一时期配种，一般是不易受孕的。
- 发情期** 一般为4-14天，是发情高峰并接受交配的阶段。表现为出血减少或停止，

- 阴户虽仍肿胀，但比发情前期软，阴门流出乳白色或黄色透明的液体；会主动接近公犬，当公犬爬跨时，会主动下塌腰部，臀部对向公犬，将尾巴偏向一边，阴门张开，允许交配。发情期的头2-3天，母犬进行排卵，这是交配的最佳时期，育犬人应该紧紧抓住这一时机。一般计算这一交配时间，可按照母犬阴户滴出第一滴血起算，到第9天为最佳时期。

发情后期 一般维持两个月，是逐渐恢

优质早餐应包含哪几类食物

俗话说：“早吃好，晚吃少”，营养早餐是健康生活的开始。不少上班族因为早上时间紧张而长期不吃早餐，这种做法不仅降低了工作效率，更重要的是对身体损害很大。一顿满分早餐应该具备5个条件，即有淀粉类食物、优质蛋白质类食物、富含膳食纤维和维生素C的果蔬、坚果和健康的烹饪方式。

- 淀粉类** 淀粉类主食多指富含碳水化合物的食物,比如面包、馒头、燕麦、杂粮等,或者是富含淀粉的豆类,如红豆、绿豆、芸豆、豌豆等，也可以是富含淀粉的薯类，如马铃薯、甘薯、山药、芋头等。这类食物在早餐中的地位非常重要。它们的主要成分是碳水化合物,在人体中,碳水化合物可以转化为葡萄糖,而葡萄糖是人体最主要的能量来源。此外,淀粉类主食有利于消化液分泌,能促进消化,对肠胃也有保护作用。无论是面包、馒头、包子,还是蒸红薯、小米粥,只要早餐中有其中的一两样,就

- 能有效保证上午的工作效率。
- 蛋白质类** 食物中蛋白质的质和量、各种氨基酸的比例,关系到人体各种蛋白质的合成与组织更新。因此，早餐中最好要有奶类、蛋类、豆类中的两种,它们不仅能为机体提供充足的蛋白质,让早餐营养更全面,还可延缓胃的排空速度,延长餐后的饱腹感,让早餐更“抗饿”。比如面包消化速度快，若搭配牛奶一起吃,就会好很多。单吃馒头、米饭容易饿,如果配上鸡蛋、豆浆、熟肉、豆制品,饱腹感就会增强。

复的正常阶段。表现为阴户肿胀消失，分泌停止，性情变得安静，不准公犬接近，并进入乏情期。如果母犬已怀孕，则发情期后为妊娠期。母犬在怀孕30天后，乳房开始发达，靠近胸部的腹部逐渐增大。

- 乏情期** 一般为3个月左右，这时母犬的生殖器官进入不活跃的休眠阶段，等待进入下一个发情前期。
- 母犬怀孕就表明进入了妊娠期。妊娠期一般为59-65天，通常按照60天正负3天(60±3天)计算。

上海三农服务热线供稿



【健康饮食】

- 蔬菜水果类** 一餐中如果没有水果、蔬菜，那么其膳食纤维数量就很难满足人体所需,而且钾、镁等营养元素也很难达到平衡。但要忙碌的现代人做到早餐中有蔬果,也不是件容易的事。其实,吃碗蔬菜沙拉、馒头、面包里夹几片生菜、黄瓜,煮面时加些青菜,或把水果洗净带在路上吃,都是简单易行的方法。
- 坚果类** 如果想让早餐达到100分,坚果必不可少。把晚上看电视时吃的瓜子、花生等坚果换到早上吃,1勺杏仁、松子或者花生就能提高早餐质量,还能预防肥胖。另外,坚果富含维生素E和多种矿物质,有利于心脏健康。
- 减少用油量** 如果您的早餐中有油炸和烧烤熏制的食品,那么你的早餐质量会大打折扣。油炸的烹饪方式不仅会使营养成分遭到破坏,还会产生多种对健康有害的物质。油条、炸糕等油炸食品热量高,含有较高的油脂和氧化物质,容易导致肥胖,也是高脂血症和冠心病的“潜在杀手”。烧烤熏制的食物,尤其是肉类,比如培根、熏肠等,可能会产生致癌物。因此为了保护食物营养，最好选择蒸或煮的烹饪方式。

中食