



源自大自然的馈赠

享受生活 选择丰美

绿丰果园

上海丰美果蔬专业合作社

地址：崇明县横沙乡育贤南路 1068 号 电话：021- 56899531 手机：15026998996 联系人：陈先生 网址：www.fengmeish.com

经营范围：

“真”开心土地领养；林地鸡鸭鹅；特色农家乐；
各类绿色有机蔬菜、大米；田园风光游等等

坚持打造绿色原生态种植环境

“真”开心农田
诚邀你的加入



东方城乡报

三农**实用**周刊

面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

[热线答疑]

猪肉腌制后晚上发光正常吗？

问：猪肉腌制后晚上会发光，正常吗？

答：猪肉腌制后晚上发光，这在秋冬季节比较常见。那是因为猪肉被发光菌污染，而发光菌适宜在低温环境下和含盐培养基上生长。发光菌形态多样，生理特性非常相似，它分解蛋白质后不形成毒物，常寄生在各种动物体上引起“发光病”，即寄生发光。

专家认为,发光菌一般不会对人体造成致病性的危害，消费者不必对此过于担忧。比如明亮发光杆菌最适生长温度约为 18℃，要杀灭这种细菌，只要加热就可以了。通常在 42℃ 的环境中，发光杆菌的生长就会停止，温度超过 70℃ 时，发光杆菌在几秒钟内就可被杀灭，因此发光的腌猪肉经洗净煮熟后可以食用。

怎么防治猪链球菌病？

问：一头母猪突然死亡，兽医讲是链球菌病，怎么防治？

答：猪链球菌病是由链球菌引起的猪急性感染、败血症的总称。它侵害各阶段的猪只，诱发多种临床症状，比如败血症、脑膜炎、关节炎、淋巴结炎，甚至死亡等。其中以猪链球菌Ⅱ型感染最为严重，并且能引起人猪感染。猪感染猪链球菌Ⅱ型的主要临床表现为败血症、肺炎、心内膜炎、关节炎、哺乳仔猪下痢、孕猪流产等，其中急性败血症的致死率很高；人感染猪链球菌Ⅱ型的主要途径是消化道和损伤的皮肤，可因食用未煮熟的病猪肉而发病。与病猪肉接触者易感染，常发生于生猪肉饲养者、屠宰者、肉品加工者、运输者、销售者、兽医、打猎者等人群。人感染后引起高热、头痛、脑膜炎、心内膜炎、胸膜炎、败血症、永久性耳聋、中毒性休克综合征等，甚至死亡。部分病例伴有皮肤发黑症状，死亡时皮肤呈焦炭样，以胸部、面部最为明显。

由于病死猪是本病传染源，所以要建立和健全生猪疫情报告制度，实行生猪集中屠宰制度，统一检疫，禁止屠宰病死猪，同时加强上市猪肉的检疫与管理，禁售病死猪肉。在本病流行区域加强猪、人及患者间感染的监测，并对猪群实行普遍免疫接种疫苗。一旦发生人畜感染链球菌病疫情，应及时按照突发公共卫生事件报告程序进行报告，并采取综合性防治措施，主要有：加强健康教育、控制传染病源、切断人与病死猪的接触等。对于病猪，可在兽医指导下进行药物治疗，主要采用青霉素和链霉素联合治疗，或头孢菌素治疗；猪舍要彻底消毒；死亡猪应无害化处理。

上海三农服务热线供稿

大棚西瓜移栽阶段应注意什么？

来自崇明的陈女士致电上海三农服务热线，说村里今年发展千亩

大棚西瓜种植，询问移栽阶段应注意些什么？

针对此问题，热线专家表示，1 月底~3 月初是大棚西瓜秧苗的移栽定植阶段，此时恰处上海最寒冷时期，绝对最低气温可能达-8℃~-10℃，且多阴雨天气少光照。利用大棚的保温蓄热功能提高棚温和地温，可提前移栽瓜果，使西瓜提早上市，填补 5 月份水果市场淡季，价格高、效益好。

移栽阶段应注意以下几点：

(1) 选好地块，深翻、细耙，调整好土壤墒情，做好防病措施。选用 5~6 年末种过瓜类、高爽、排水灌溉方便、土质疏松、肥力好的地块，深翻 30 厘米以上并耙细。如土壤偏干可浇水补墒情，如过湿则应及早搭棚，以避雨、通风、降低土壤湿度。地块翻耙时每亩撒入 2~3 斤敌克松或多菌灵杀灭土壤残存病菌，同时要开好深 30 厘米以上的棚与棚之间的沟，和深度超过 40 厘米的出水沟，以利于及时排走雨水。

(2) 提早搭好大棚、盖好膜，提高地

温。移栽前 20~30 天搭好大棚，盖上天膜；移栽前 10~15 天铺好地膜，搭好中小棚，盖好膜。

(3) 炼苗、喷洒杀菌药水。由于育苗场与移栽地温度相差较大，所以应在移栽前一周开始，晚上逐步不再对苗床加温，降低床温以炼苗。移栽前 5 天不浇或少浇水，移栽前隔夜浇好水并喷洒多菌灵或托布津或阿米西达等杀菌药，做好防病措施。

(4) 适时移栽。大棚内套中棚、小棚的数量与保温效果呈正相关，大棚内套中棚、小棚、小小棚的四层覆盖可于 1 月底 2 月初移栽，而大棚内套小棚、小小棚的 3 层覆盖则必须避开上海最冷时段于 2 月底 3 月初移栽。铁管大棚比竹大棚保温效果好，移栽时间可相应提前些。

(5) 精心移栽，确保全苗。经 3~4 层膜 10~12 天覆盖保温蓄热后，移栽时地温可提高 10~12℃。为防地温散失，移栽时揭开的

淡水鱼病防治八宜八忌

进入春季,气温和水温不断上升,各种病原生物活动加强,同时鱼类经过越冬期,体质较弱,对致病因子抵抗力相对较差,容易感染各种疾病,给养殖者造成较大损失,并严重影响存活个体后期的生长。为此,切实做好春季鱼病防治工作,是全年养殖增产的关键。

宜无病先防，忌病后寻药

鱼类发病初期症状不易观察到，待发现时病鱼常已很少摄食或停止摄食，给用药带来困难。

宜定期预防，忌人防我防

鱼类发病都有一定的周期性。如初春、晚秋低水温期鱼类易发水霉病；初夏、仲秋易发草鱼及青鱼的老“三病”；夏季高水温期则是暴发性鱼病的高发季节。根据鱼病发生的这种规律性，可以超前预防。

宜综合预防，忌单一用药

鱼类发病是综合因素作用的结果，因而预防鱼病必须针对各类致病因子、采取综合措施，抑制病原体，改善水环境，提高鱼体抗病能力。包括彻底清塘、鱼种消毒、定期注水和施用生石灰、科学施肥与投饵，定期

内服外治等。

宜低温消毒，忌高温药浴

药浴是防治鱼病的重要方法，一般都在低温季节放养鱼种时，在木桶或木盆里进行，夏季采用这种方法，由于水温高，药物作用增强，危害性很大。

宜轮换用药，忌单一用药

水体中如单用一种药物防病治病，鱼类的各种致病菌和寄生虫会产生抗药性，降低用药效果，应积极推广轮换混合用药，但酸性药物和碱性药物不应混合使用。

宜择时用药，忌随时用药

鱼药的使用效果，尤其是全池泼洒药物的使用效果与水混、溶氧、光照等有密切的关系。水温高、溶氧丰富、光照强，可以加快用药生效速度和提高药效，减轻用药副作用。

用，因而防治用药宜在晴天午后进行。

宜适量用药，忌乱加药量

各种鱼药用量都是经多次试验后确定的，可有效地防治鱼病，且副作用小。如过量使用，不但加大了成本，而且有可能造成药害。

宜用非金属容器贮溶药物，忌用金属容器

鱼药大都是化学合成药物，化学性质不太稳定，易与金属发生化学反应，成分和性质都发生变化。因此贮存、溶化鱼药应选用陶瓷、木材、塑料等非金属材料制成的容器。

王笠

春季养生的最佳食物

自然界的规律是春生、夏长、秋收、冬藏。春季春阳升发、乍暖还凉，要合理调整饮食，有目的地选择一些适合春季的食物。

时令食物春之芽

春日食春芽是大自然的赐予，中医经典著作《黄帝内经》说要“食岁谷”，意思就是要吃时令食物。春天里所有的植物都生发出新鲜的嫩芽，其中，可以食用的春芽有很多，如香椿、豆芽、蒜苗、豆苗等。

四鲜之首是春韭

春日尝鲜，首推春韭。春天气候冷暖不一，需要保养阳气，而韭菜最宜人体阳气。韭菜含有挥发油、蛋白质、脂肪和多种维生素等营养成分，有健胃、提神、强肾等功效。春韭为韭菜中的佼佼者，味道尤为鲜美。其根白如玉，叶绿似翠，清香馥郁。春韭吃法多样，既可佐肉、蛋、虾、墨鱼等，又可做蒸包水饺的馅料。炒绿豆芽或豆腐干时加些春韭，格外芳香可口。

菠菜解毒防春燥

春天里吃食的菜蔬还有菠菜，菠菜一年四季都有，但以春季为佳，“春菠”根红叶绿，鲜嫩异常，最为可口。春季上市的菠菜，对解毒、防春燥颇有益处。中医也认为菠菜性甘凉，能养血、止血、敛阴、润燥。因菠菜含草酸较多，有碍钙和铁的吸收，吃菠菜时宜先用沸水烫软，捞出再炒。

葱蒜杀菌助春阳

葱、姜、蒜不仅是调味佳品，还有重要的药用价值，可增进食欲、助春阳，还具有杀菌防病的功效。春季是葱和蒜在一年中营养最丰富，也是最嫩、最香、最好吃的时候，此时食之可预防春季最常见的呼吸道感染。

入脾养血龙眼干

龙眼干安神。肝血不足、气血循环不佳

者，易在春天睡不好、没精神，龙眼干可入脾养血，晚上睡不好、易头晕的人可多吃。不过常口干舌燥、易上火、体质较燥热的人则少吃，建议一天不要吃超过半个手掌的量。

温补脾胃有糯米

糯米糕补体力。糯米有补中益气、补充营养的作用，寒凉的早春天气吃糯米，可温补脾胃、养血安神，适合脾胃气虚、常腹泻的人，也就是适合天冷时容易肚痛腹泻或肚子冰凉的人吃，但糯米不易消化，若是消化不良的人，1 天吃约半个手掌的量即可。中食

面/向/郊/区 服/务/农/业 做/农/民/的/朋/友