

东方城乡报

三农**实用**周刊

面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

【蔬菜病虫害诊断与防治】

番茄晚疫病

(接上期)

果实染病 多在青果附近果柄处产生灰绿色水渍状硬斑块，褐色至黑褐色，稍凹陷。潮湿时病部长出白色霉层，病果质地硬实，不软腐，易脱落。

茎和叶柄染病 出现暗绿色水渍状斑，扩大后病斑暗绿色，稍凹陷。田间湿度高时，病斑周围产生一层白色霉层。

苗期染病 病斑由叶片向主茎蔓延，嫩茎部缢缩腐烂，病部以上枝叶死亡。湿度大时病部表面产生白色霉层。

【发生规律】

病菌主要以菌丝体在马铃薯薯块上或保护地番茄上危害并越冬，也能以厚壁孢子随病株残余组织遗留在田间越冬，并成为第二年的初侵染源。在环境条件适宜时，中心病株产生的孢子囊及游动孢子，通过雨水飞溅、灌溉水及气流传播至寄主植物上，引起再次侵染。

病菌喜温暖高湿的环境，适宜发病的温度范围 10℃~32℃；最适发病环境温度为 18℃~25℃，相对湿度 95%以上；最适感病生育期为成株期至座果期。发病潜育期 3~5 天。

(未完待续)

上海奉贤拍卖行拍卖公告

受有关部门委托，我行定于2014年6月20日公开拍卖旧车一辆和黄金饰品一批。现将有关公告如下：

- 一、拍卖标的
1、旧车一辆(不带牌)
- 2、黄金饰品一批(详见清单)

二、咨询、登记时间：

1、2014年6月18日、2014年6月19日 上午：9:00—11:00 下午：13:00—15:00

2、咨询登记地点：上海市奉贤区南桥镇解放中路249号

3、联系电话：57185234

4、联系人：盛先生

三、拍卖时间、地点：

1、拍卖时间：2014年6月20日(星期五)上午 9:30

2、拍卖地点：上海市奉贤区南桥镇解放中路249号

注：1、竞买人持身份证和《企业法人营业执照》登记及法人身份证登记。2、竞买人委托代理人参加竞买的，代理人必须出示合法有效的委托文书。拍卖保证金：2000元，必须在拍卖会(2014年6月19日15:00时)前解缴至本公司账户后方可办理拍卖登记手续。3、具体参拍资格由上海奉贤拍卖行与委托方审核。

上海奉贤拍卖行

2014年6月12日

遗失声明

金杨街道美伦服装经营部遗失税务登记证副本，编号：430626196204081919；国税通用定额发 票：04321601 -04321650、04968501 -04918550、04035151 -04035200、05343701-05343750，声明作废。

2014年上海市经济作物安全监管工作会议在市农技中心召开

部署监管工作重点 提升安全生产水平

为进一步提升上海郊区经济作物安全生产与安全监管水平，总结上海市经济作物安全监管工作经验，部署下阶段经济作物安全监管工作重点，近日，由上海市农业委员会种植业办与上海市农业技术推广服务中心联合举办的 2014 年上海市经济作物安全监管工作会议在市农技中心成功召开，市农委种植业办、市农技中心以及各区县农技中心、林业站（署）、崇明县蔬菜科学技术推广站等相关负责人出席了此次会议。

首先，市农技中心相关科室负责人就上海市 2014 年种植业农产品农药残留量监测方案、检测情况以及经济作物推荐农药的情况进行了介绍。然后，嘉定农技中心与浦东农技中心作为区县代表，就经济作物安全生产与安全监管工作的经验作了典型发言，其他各区县就本地区经济作物安全监管工作开展情况、存在的困难以及经验总结进行了交流。随后，市农技中心张瑞明副主任、种子管理总站夏建明副站长就开展经济作物安全监管工作的重要性和长期性作了强调，提出通过宣传、培训、引导，以及配合行政执法将安全监管工作落到实处，形成安全监管长效机制。

制。

最后，市农委种植业办瞿元弟副主任就 2014 年度上海市经济作物安全监管工作做出了具体部署，要求严格安全监管，强化责任落实，提升生产水平：一是明确安全生产与监管的主体。做到责权明晰、理顺关系，生产者 是经济作物安全生产的主体，区县、乡镇等各级政府是经济作物安全监管的主体。二是建立健全安全生产的网络体系。以安全生产和 安全监管为纽带，形成市、区县和乡镇相关部门齐抓共管的网络体系。三是加强安全生产技术指导。坚持“安全第一，预防为主”的方针，依靠病虫害预测预报和先进



生产栽培技术，加强投入品管理，严格过程控制，进一步落实安全生产责任制，形成安全生产长效机制。四是加强执法检查力度。认真组织开展安全检查和专项安全督查，统筹安排，突出重点，兼顾一般，在开展集中执法检查的同时，切实加强日常监管，加大执法检查力度，避免多头监管，全力保障经济作物安全生产形势平稳。五是加强安全生产相关知识普及。通过开展专项培训、分发传单、媒体宣传等形式向广大种植户宣传安全生产知识，使安全生产观念深入人心。

上海市农业技术推广服务中心供稿

“2014 年上海市西瓜生产企业‘评优、推优’”活动成功举办

近日，由上海市瓜果行业协会、上海市农业技术推广服务中心、上海市园艺学会和上海果品商业行业协会共同举办的“2014 年上海市西瓜生产企业‘评优、推优’”活动落下帷幕。经过评委组专家现场品评以及前期对基地环境、基地规模、果园安全生产管理及认证、商标注册、企业产品质量追溯体系

建设情况等的综合评价，参评的 28 家西瓜生产企业选送的 30 个中、小型西瓜样品（品种有早佳（8424）、小皇冠、早春红玉等）中评比产生金奖 6 名、银奖 11 名、优质奖 11 名。其中浦东新区上海田博瓜果专业合作社的“田博”品牌、上海李氏蔬菜专业合作社的“李氏”品牌、上海桃咏桃业专业合作社的

“桃咏”品牌、上海越亚农产品种植专业合作社的“越亚”品牌，以及金山区上海廊下果蔬园艺有限公司的“鑫品美”品牌、上海漕泾农业有限公司的“多利升”品牌在评选中荣获金奖。

上海市农业技术推广服务中心供稿

香菇转色期 管理学六招

香菇转色越夏期间正值高温季节，常常会因为环境条件变化或管理不当使菌棒出现异常现象影响产量和质量。因此，当菌棒瘤状物形成，进入转色越夏期间，要加强管理，一般不要移动或碰撞菌棒，管理上重点要抓好“控温、通风、喷水、变温、刺激、病虫害防治”等技术环节。

一是温度调控 转色期间要求温度 18℃~22℃。生产过程中，棚内温度最好控制在 33℃以下，温度过高时，要增加遮阴物或加盖遮阳网，严禁阳光直接照射到菌棒上。

二是水分管理 转色期间棚内空气相对湿度 70%~80%为宜，转色时环境湿度过大，会引起菌丝徒长，影响产量；湿度过小，菌棒难以转色。转色前期，可在早晚进行地面洒水，增加棚内的空气湿度。菌棒转色后进入雨季，棚内空气湿度较大，要停止喷水，若湿度超过 80%时，可向地面洒干石灰粉降湿。

三是变温管理 在香菇转色期前，白天棚上要盖草帘，底下留通风口，晚上可揭开草帘和薄膜让空气充分进入。这样，白天和

晚上的温差可达到 10℃以上，连续 3~4 天的大温差刺激，菌棒表面就会出现不规则的白色裂纹，很快即进入转色期。

四是刺激转色 干湿交替的刺激，有利于转色，喷水后空气越流通，越容易转色。因此，在通风换气时，还要注意结合通风进行喷水保湿。另外，光线明暗交差的刺激也有利于转色，要增加散射光照射。

五是加强通风 生产实践表明，温度达到 34℃以上，通风良好的情况下，菌丝也可安全越夏，而不通风时，持续 4 个小时 34℃~35℃以上的高温，就可能造成“烧菌”，导致菌丝死亡。目前正是香菇越夏高温季节，必须加强通风。管理上要求晴天棚两侧的草帘可掀起 40~50 厘米高，防止阳光直接照到



菌棒上，阴天时，草帘掀的程度要大。转色后的菌棒着点小雨没有问题，因此，塑料薄膜可揭到棚的上部，以增加通风降温效果。下大雨时，可将薄膜放下，但棚的两头仍然要留通风口通风。

六是虫害防治 进入夏季，是虫害多发季节，要搞好大棚内外环境卫生，发现菇蝇等害虫，可在棚内地面和棚面上喷菇虫净药液，一般 7 天一次，连喷 2~3 次。据试验，大棚内挂诱虫板效果很好，48m² 棚挂 5 片即可。另外，可将棉球在敌敌畏药液中蘸一下，挂在棚内，48m² 棚挂三个棉球即可。为防虫子进入菇棚，可在大棚通风口装上防虫网防虫。

于莹光

【实用技术】

越夏韭菜巧管理

停止收割 一般从 6 月下旬至 8 月上旬应停止收割，以利于植株生长。夏季高温导致韭菜营养积累少、消耗大，影响植株生长，且叶片组织纤维增多，质地粗糙，商品性差，生长呈现歇伏现象。因此，一般不再收割。

防倒伏 夏季天气炎热多雨，两年生以上的韭菜，夏季如不割，株高叶茂易倒伏，严重影响通风透光，易发病。为防止韭菜倒伏，减少病害，应为韭菜搭架。

摘薹 由于韭菜开花结籽时

会大量消耗养分，因此除采种田外，还应在韭菜薹幼嫩时及时摘除，培养健壮植株。

加强肥水管理 依据苗情、墒情和天气情况，每隔 7~10 天浇 1 次水，并随水追施人粪尿和尿素化肥 3~7 次。最好是冲施质量较好的生物有机肥。

及时防治病虫害 夏季要注意排水防涝，暴雨之后，用井水浅灌，降低地温，并摘除地面黄叶，使行间通风良好，减轻为害。还可用 50%多菌灵 500 倍液灌根防治。

中农

丝瓜如何防烂花

蘸“小花” 丝瓜“大花”花瓣大、较薄，容易感染病害，而“小花”花瓣小、较厚，抗病性强，所以丝瓜“小花”比较好。要想蘸“小花”，就要特别注意蘸花时间，一般在上午 10 点至下午 1 点之前蘸花，幼瓜小，蘸出来的花瓣小，抗病性强，而在下午 3 点后蘸的花，一般花瓣大。

分次放风 分两次放风，第一次是在拉开草帘一小时以后，拉开一道小风口，一般 5~10 分钟后关闭放风口，以此来对流空气；在棚温达到 28℃时放第二次风，这次要

根据天气情况来确定具体放多长时间。并且不要一下子将放风口全部拉开，避免“闪”了花，造成花干边。要循序渐进，逐渐加大放风口。

早防烂花 丝瓜烂花主要有干烂花和水烂花两种。干烂花症状：花瓣的边缘出现干枯，为干烂，整个花瓣都不新鲜，这可能是蔓枯病在花上的表现症状。在弱光的情况下发生较重，尤其是连阴天过后出现较多。水烂花症状：从花瓣的边缘开始出现水烂状，严重时花瓣出现滴水的症状，有时有臭味，有时没有但有白色的霉菌。

宋利玲