上海旺园家禽养殖专业合作社

以人为本，以德为先
创建国内一流的家禽科技企业地址：奉贤区奉城镇卫季村 1154 号
联系电话：021-57175121
手机：13901659483

三农实用周刊

面向郊区/服务农业/做农民的朋友

【教你一招】

夏季养鸡严防高温危害

夏季天气高温炎热，为保证夏季鸡群的正常生长发育，提高蛋鸡的产蛋率，养鸡户必须采取以下综合控制措施：

改善鸡舍环境

控制鸡舍温度，在鸡舍四周种植柿、核桃等枝条长，树冠大而透风性好的树种；屋顶及外墙壁还可种植藤蔓植物遮荫；敞开门窗通风换气，有条件的可在舍内安装吊扇或换气扇等；鸡群饲养密度不能过大，必要时，可在晚上剪去鸡翅下面及腿部的羽毛，以便鸡体散热。

调整饲喂方法

调整日粮浓度，增加日粮中蛋白质和钙、维生素等含量，降低能量含量。如采用湿料喂饲时，最好采用凉水现喂现拌；尽可能地喂些青饲料，以保持鸡群的食欲。另外，鸡群喂料要少喂勤添，不要剩料，饲喂时间要改在清晨、傍晚前及夜间凉爽时。

供足新鲜饮水

夏季鸡群饮水量明显增加，一般为采食量的3~5倍，每只日饮水量为90~325毫升，产蛋率越高，需水量越大。因此，鸡舍内要增添饮水器或水槽，保证全天连续足量供应新鲜卫生饮水，饮水要保持清凉，水温以10~13℃为宜。当气温超过30℃时，在饮水中适量加入维生素C或电解多维，以改善鸡只的心血管代谢，增强机体对高温的适应能力。

减少应激发生

强烈运动会增加鸡心脏负荷，易发生热衰竭，所以要减少鸡群的运动，避免转群、运输及噪音等干扰。饲养人员在观察、喂料、供水、打扫卫生、拣蛋等时，动作要轻，保持鸡舍安静，防止粗暴喧哗惊吓鸡群而引起应激。当鸡群因高热而喘息不止时，要采取紧急措施，用水喷淋鸡头部，帮助鸡散热，减少热昏厥的发生。

加强疫病防治

按免疫程序及时做好养殖鸡群的免疫接种；鸡舍门窗要加设纱窗，及时清粪，并注意定期做好舍内外环境卫生工作，防止蚊蝇鼠及外部寄生虫，消灭疫病传播。 刘万珍

【生猪行情】

肉猪价格(元/公斤)

闵行区:14.0
嘉定区:13.6
浦东新区:13.0-14.0
奉贤区:13.4-14.0
金山区:13.9
崇明县:13.8
长兴区:13.8

(本期是2014年6月13日所采的价格。)

沪郊毗邻地区苗猪交易价(元/公斤)

嘉定区:27.0
浦东新区:22.0-24.0
奉贤区:24.0

(本栏信息由上海市生猪行业协会提供)

本版由上海市生猪行业协会协办

第五届中国奶业大会暨第十二届中国国际奶业展览会召开
创民族品牌 建一流奶业

近日，中国奶业协会主办的第五届中国奶业大会暨第十二届中国国际奶业展览会在西安举办。本届大会主题是“创民族品牌，建世界一流奶业”。大会分析了当前我国奶业发展面临的新形势，明确了今后一个时期我国奶业发展的方向和目标。农业部副部长、国家首席兽医师于康震到会讲话，中国奶业协会会长高鸿宾作了主旨报告。

高鸿宾在主旨报告中指出，总体看，我国奶业经过五年的整顿和振兴，正逐步摆脱婴幼儿奶粉事件的严重影响。奶牛标准化规模养殖加快推进，良种覆盖率逐年扩大，单产水平不断提高，生鲜乳质量安全持续向好，奶业发展已站在新的起点上，具备了创建世界一流奶业的基本条件。2013年，奶业发展一枝独秀，特点鲜明。主要表现是规模化水平、单产水平、机

械化水平、养殖效益、质量安全水平、信息化监管水平、社会资本进入量、国际化水平均显著提升。奶业正在从散养向规模养殖转变，从粗放型向集约型转变，从饲喂秸秆向饲喂青贮玉米和苜蓿转变，从人工挤奶向机械化挤奶转变，从人盯人、人盯站向信息化监管转变。目前，我国奶业已具备创民族品牌，建设世界一流奶业的条件，同欧美奶牛场相比，饲养技术、装备水平、设施条件、质量控制、环境条件等都没有太大的差别，加工更是如此。

高鸿宾要求，奶业协会要充分发挥协调、服务和管理职能，为创民族品牌，建世界一流奶业营造大环境和好氛围。企业要珍惜来之不易的良好发展势头，百尺竿头更进一步，自觉担当“自律诚信、质量第一、对消费者负责”的

社会责任，积极践行“奋斗、和谐、共赢”的行业竞争理念，真正撑起民族品牌“安全、优质、放心”的旗帜，为我国奶业和畜牧业进入“世界一流”做出新的更大的贡献。

第五届奶业大会期间，举办了国家学生饮用奶计划推广论坛、中国-新西兰奶业技术研讨会暨中国奶业协会饲料饲养与环境专委会会议、中国奶牛群体遗传改良体系建设论坛、奶牛疾病防治与安全用药论坛等16个研讨专场。研讨专场为业内管理、技术人员提供了一个难得的切磋交流机会。来自全国各奶业有关行政管理部门、行业协会、奶牛养殖场(户)、奶站、乳品加工企业、奶业机械设备企业、教学科研单位等2000余人参加了奶业大会和展览会。 张院萍

猪群安全度夏要点

夏季来临，气温升高，湿度变大，生猪很容易发病，因此必须对猪舍内环境温度进行控制，加强防暑降温工作，确保生猪安全越夏，提高养猪效益。

●保持清洁

夏季是蚊蝇出没旺季，不但造成猪场生产环境恶劣，更重要的是给猪场防病带来了困难。所以，要定期对猪舍内外环境，包括栏舍、场地和用具、器械，以及排水道、空气以及母猪全身体表等进行消毒，还应注意一些卫生死角的消毒。同时必须重视空栏消毒工作，做到彻底空栏，坚持“全进全出”原则。使用对环境适应范围广的消毒剂品种，如氯制剂等；夏季阳光充足，能有些消毒剂迅速分解而失效，如聚维酮碘、络合碘等不宜在室外使用。

●科学饲喂

夏季应多喂富含维生素、矿物质的青绿饲料和果皮，如西瓜皮等清凉饲料；在混合料中适当添加咸味、鲜味或香味等调味剂，以提高饲料适口性，增加猪的采食量；禁止饲喂发霉饲料。夏季喂猪可每日喂4次，为减少猪在最热时段的活动量，可于凌晨4时、上午10时、下午4时、晚上9时各喂一次。要保持食槽内有充足的清凉饮水。每天还要给猪饮一次0.5%的淡盐水以调节体温。

●安全防护

猪在气温上升到35℃以上或下降到零下5℃~10℃时，饲料利用率低，增重慢。高温季节应根据猪的不同类别和猪的不同生理阶段给予不同的饲养管理。

公猪 每天喂食两次，中午加喂青饲料或稀料，配种和运动均在早晚进行。每天下午1时至3时给猪体、地面喷水1次，光照减到8小时至10小时，如果配种次数少则应减少精料喂量，防止过肥，性欲差。

怀孕母猪 避开高温季节配种繁殖，怀孕前期(0天~84天)的母猪应以青粗料为主，适当搭配精料，降低饲养密度，每圈养2头~3

头。怀孕后期及哺乳期一猪一圈，应以精料为主适当搭配青料，粗料可以不喂，每天喂3次，中间加喂稀料，喷水1次。料中加1%~1.5%小苏打、0.3%食盐。

临产母猪 夏天产房应选通风良好，并有遮阳设施的产仔栏。产母临产前2天~3天减少精料，多喂青料，精料中麸皮比例要提高，以清肠通便为目的，防止难产，避免造成产后不吃食、缺乳。产完仔后喂麸皮温盐水1次。

商品大猪 高温季节难养，常出现倒槽不吃食，影响生长。一般在高温季节未到之前将肥猪出售，如果不出售，应降低饲养密度，每圈少养几头，每头猪占圈面积1平方米~1.2平方米。喷水降温，早晚喂料，中午加喂青料或稀料，料中加小苏打1.5%、盐0.3%。

哺乳仔猪及小猪 喜卧阴湿地面，注意天气变化以防着凉拉白痢或拉稀。保持圈面干燥，供清洁饮水，常消毒。预防可用每公斤料加120毫克土霉素喂几天，治疗时每公斤料加土霉素200毫克。

【链接】

夏季猪吃点“苦” 营养又解暑

苦瓜 苦瓜营养丰富，全株和瓜都可鲜喂，味苦性寒，有清热解毒、泻肺火、清热健胃的功效，是猪保健的一种好饲料，特别对暑期发热的猪，有较强的退热消炎作用，有改善胃口，促进食欲的疗效。

莴笋 又叫千金菜、莴菜。性凉，味甘、甘，具有消暑解毒、健胃消积、通利小便、开胸利膈、顺气调中、清热化痰、利气宽胸的作用。

丝瓜 为葫芦科攀援草本植物，所含各类营养在瓜类食物中较高，所含皂甙类物质、丝瓜苦味质、黏液质、木胶、瓜氨酸、木聚糖和干扰素等特殊物质具有一定的特殊作

用。有清凉、利尿、活血、通经、解毒之效。

苦马菜 又叫曲麻菜、苦苣菜、苦麻菜、茶草、苦菜。苦苣菜柔嫩多汁，适口性好，营养价值高，粗蛋白含量达9%~12.8%。性味苦、寒，有祛火消食、增加食欲、清热解暑的作用。苦麻菜一般生喂好，切碎、打浆或整棵喂，猪都喜食，采食量大增，猪长得快，母猪爱下奶，发病少。

具体喂法 最好现制鲜喂，将鲜草打浆或切成2~3厘米长拌料，每头猪用量为100~180g，每天4~5次，由少到多，逐渐增加。也可制成干粉添加在猪饲料中饲喂，添加量为2%~8%。 中技

【实用技术】

犊牛管护需用心

初生犊牛对外部环境的适应有一个过程，其间需要细心呵护。

净身 清除犊牛口、鼻黏液，以免影响犊牛的呼吸；让母牛舔干犊牛身上的黏液，以利于牛犊呼吸器官机能的提高和肠蠕动，同时，胎液中的某些激素还能加速母牛胎衣的排出；除去脚上的脚质块。

断脐 在距腹部4~6厘米处用消毒的绳子扎紧，再在结子下方1~1.5厘米处剪断，然后用碘

酒敷于断端，并用布包扎，以防感染。

哺乳 犊牛出生后4~6小时对初乳中的免疫球蛋白吸收力最强，故在出生后0.5~1小时饲喂初乳，使其尽早获得母源抗体，以增强犊牛对疾病的抵抗力。体弱的犊牛要人工辅助哺乳，直到自己会吃乳为止。

检查 检查母牛胎衣是否正常。检查后要立即拿走胎衣，以防母牛吃掉。

郑飞

舍饲育肥羊日粮配合五原则

原料质量 羔羊育肥要选用易消化的优质干草、青贮饲料、多汁饲料，严禁饲喂有毒和霉烂的饲料。所用饲料要干净卫生，同时注意各类饲料的用量范围。

搭配合理 羊是反刍家畜，能消化较多的粗纤维，以青、粗饲料为主，适当搭配精料。对早期断奶育肥羔羊应适当降低粗饲料比例，提高精料比例。

因地制宜 应充分利用当地饲料资源，特别是廉价的农副产品，以降低饲料成本；同时要多种

搭配，既提高饲料的适口性，又能达到营养互补的效果。

相对稳定 若突然变换日粮组成，瘤胃中的微生物不能马上适应各种变化，会影响瘤胃发酵、降低各种营养物质的消化吸收，甚至会引起消化系统疾病。

体积适当 育肥羊对饲料在满足一定体重阶段日增重的营养基础上，喂量可高出饲养标准的1%~2%，但也不要过剩。饲料的采食量大致为10千克体重0.3~0.5千克青干草或1~1.5千克青草。 魏县