



源自大自然的馈赠

享受生活 选择丰美

绿丰果园 上海丰美果蔬专业合作社

地址：崇明县横沙乡育贤南路 1068 号

电话：021- 56899531

手机：15026998996

联系人：陈先生

网址：www.fengmeish.com

经营范围：

“真”开心土地领养；林地鸡鸭鹅；特色农家乐；各类绿色有机蔬菜、大米；田园风光游等等

坚持打造绿色原生态种植环境





东方城乡报

三农**实用**周刊

面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

[热线答疑]

栾树怎样播种育苗？

问：栾树怎样播种育苗？

答：栾树一般采用种子播种繁殖。栾树的种子种皮坚硬、不易透水，如不经过催芽处理，翌春播种常不发芽或发芽率很低，所以必须先采用层积法进行催芽，即在种子收获后，晒干，用湿沙子包埋，堆于低温、避雨、通风处过冬，春季种子萌发后即可播种。

育苗时先要做好苗床。育苗地要求土壤疏松，有一定肥力，无地下害虫。整地要精细、平坦，做成宽 1 米左右的畦。先浇好底水，再将催好芽的种子播上，一般每平方米播 50~100 克，然后覆盖 1~2 厘米厚的细土或黄沙，防种子干燥，再用草、秸秆等覆盖。北方较冷，可搭小环棚保温保湿。冒芽后应注意土壤湿度，如过干，应及时浇水。等苗高 5~10 厘米时可起苗，将苗装入营养杯继续培育。

双孢蘑菇春菇如何调水？

问：双孢蘑菇春菇如何调水？

答：3 月上旬以后，当菇房温度稳定在 12℃ 以上时，双孢蘑菇进入春菇管理阶段。春菇调水应视培养料、覆土层的干湿情况进行。先调足土层水分，以满足出菇需要，方法是：用 pH8~9 的石灰水上清液，以轻喷、勤喷、来回喷的方式逐步调，以土粒不粘手为宜。调整土层水分后进行保温保湿，空气相对湿度保持在 80~85%。见床面有新生绒毛状菌丝出现时，加覆一层湿细土将其盖住，随即进行出菇调水。出菇调水要结合天气情况和子实体所需水分进行，程度掌握在细土捏得扁、不粘手，空气相对湿度保持在 90~95%。春菇调水的总原则是：3 月稳，4 月准，5 月狠，并经常喷石灰水，及时调节培养料 pH 值。等室温超过 22℃ 时结束栽培。

上海三农服务热线供稿

农机具进入《农机采购目录》应如何办理？

来自上海市的顾先生致电上海三农服务热线，询问农机具进入《农机采购目录》应如何办理？

针对此问题，热线专家表示，农机具进入《农机采购目录》，首先是申报范围：根据农业部、财政部、国家发展和改革委员会制定的《国家支持推广的农业机械产品目录管理办法》（农机发〔2005〕7 号，以下简称《办法》），结合 NY/T 1640-2008《农业机械分类》标准，申报范围包括耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工机械、排灌机械、畜牧水产养殖机械、动力机械、设施农业设备等 10 大类 31 小类 88 个品目（具体产品每年有所调整）。其次是基本要求：

（一）企业资质

（1）列入《国家支持推广的农业机械产品目录》（以下简称《目录》）的企业应是在

中华人民共和国境内注册的、具有企业法人资格的生产企业。

（2）插秧机、谷物联合收获机械、轮式拖拉机的生产企业注册资金应在 1000 万元以上，员工人数应在 100 人以上。其中，大型谷物联合收获机械（喂入量 4.0kg/s）企业注册资金应在 2000 万元以上，150 马力以上的轮式拖拉机企业注册资金应在 5000 万元以上。其他生产企业的注册资金应在 500 万元以上，员工人数应在 60 人以上。

（二）产品资质

（1）列入《目录》的产品应是在中华人民共和国境内生产的产品。国家实施生产许可和强制性认证等管理的产品应获得相应的资质证书并且在有效期内。安全防护和安全警示标志应符合国家强制性标准。

夏季精养鱼塘如何有效防止浮头和泛池

精养鱼塘由于鱼种放养密度高，投饲量大，水中有机物和耗氧因子多，到了高温时节，鱼类容易因缺氧而引发浮头，稍有不慎，可由浮头转为泛池，从而给养殖生产造成严重损失。因此，在高温季节，养殖户必须要加强精养鱼塘的科学管理，注意防止鱼类浮头和发生泛池事故。

引发鱼类浮头的原因

（1）因水层温差产生急剧对流而引发浮头

在夏季高温时节，精养鱼塘水质浓肥，白天上、下水层氧差很大，至午后，上层水溶氧饱和，下层水严重缺氧，由于水的热阻力，风平浪静，使上、下水层不易对流。傍晚以后，如果突然下雷阵雨或刮大风，使表层水温急剧下降，造成上、下水层急剧对流，上层溶氧量较高的水迅速对流至下层，很快被下层水中的有机物耗净，偿还氧债，而上层水溶氧量降低后又得不到及时补充，因而使整个池塘的溶氧量迅速下降，造成缺氧浮头。

（2）因水质过肥或败坏而引发浮头

夏季高温时节，精养鱼塘大量投饲，使饲料残余物、鱼类排泄物增多，池水变肥。如果久晴不雨，又长期不加注新水，易使水质过肥（水色转黑）或败坏（因浮游植物繁殖过度而导致大批死亡，水色转浑发臭），引发鱼类浮头。

（3）因光合作用不强而引发浮头

如遇阴雨连绵或大雾天气，此时光照条件差，浮游植物光合作用弱，水中溶氧补给数量少，而池水中各种生物呼吸和有机物分解又不断地消耗氧气，以致水中溶氧供不应求，引发鱼类缺氧浮头。

（4）因浮游动物大量繁殖而引发浮头

由于水蚤、轮虫等浮游动物过度繁殖，大量滤食浮游植物，使池水转清，水中溶氧主要依靠空气溶入来补充，远远不能满足耗氧需求，引发鱼类浮头。

防止浮头的措施

（1）冬季清塘时，要清除池底过多的淤泥和腐殖质。

（2）要做到合理混养和密养，要合理控制投饵、施肥数量，高温季节塘鱼存储量不能过大。

（3）发现池水过于浓肥有浮头危险时，应及时加注新水，以增加水中溶氧，调节池塘水质。

荔枝食用禁忌及挑选技巧

新鲜荔枝汁多味甜，是大家很喜欢吃的水果，但民间也有“一颗荔枝三把火”之说，可见多食荔枝对身体有害无益。

不宜空腹食用

鲜荔枝荔枝的含糖量很高，空腹食用会刺激胃黏膜，会出现胃痛胃胀。而且空腹食用过量会因体内突然加入过量高糖分，而发生“高渗性昏迷”。

不宜大量进食荔枝

大量进食荔枝且吃饭很少，容易引发突发性低血糖症，出现头晕、口渴、恶心、出汗、肚子疼、心慌等现象，严重者会发生昏迷、抽搐、心律不齐等。这些症状都是大量食用荔枝后产生的突发性低血糖，医学上称为荔枝急性中毒，也叫“荔枝病”。荔枝的糖分是果糖，但当人体摄入果糖后，要由转化酶把果糖转化为葡萄糖后才能吸收。荔枝吃

得太多，转化酶供不应求，不但不能把果糖转化，反倒会让血液内葡萄糖不足，出现头晕、心慌、脸色苍白、眩晕、晕厥类近低血糖症状，医学上称之为荔枝急性中毒，也称“荔枝病”，表现为清晨发病，常以出汗、肢冷、乏力、轻泻等为前期症状，其后突然抽搐、昏迷。一次食用荔枝不要超过 10 个，多食会令肝火上升，喉干舌燥，严重的会引起恶心、四肢无力、晕眩等不适。尤其对于儿童，吃 3~4 粒即可，吃多易生热病。

糖尿病人慎吃

荔枝的糖分很高，所以糖尿病人慎吃。同时，阴虚火旺、有上火症状的人不要吃，以免加重上火症状。咽喉干疼、牙龈肿痛、

（2）在本年度内发布的国家产品质量监督抽查结果中，未列入质量较差的产品名单。

（3）在省级以上消费者协会或农机产品质量投诉监督机构的报告中，不存在未及时处理的质量投诉案件。

（4）列入《目录》的产品应获得省级以上农业机械推广鉴定证书，鉴定依据应是已公布的农业机械试验鉴定大纲，内容应包括生产条件审查、性能试验与安全检查、适用性和可靠性试验、使用说明书和“三包”凭证审查、用户调查。

（三）其他

产品性能检测和农业机械推广鉴定申请等相关事宜请与上海市农业机械试验鉴定站联系。

上海三农服务热线供稿

解救浮头的方法

（1）立即大量灌注新水，并同时开动增氧机增氧，这是最有效的解救措施。

（2）在灌水有困难，又无增氧机的情况下，可采用下列其中一种应急措施：①每亩池塘用干黄泥 100 千克，加食盐 5 千克或生石膏粉 2.5 千克调成浆，全池泼洒；②每亩撒施尿素 1 千克~1.5 千克；③每亩用食盐 5 千克~10 千克或明矾 3 千克~5 千克溶水全池泼洒；采用上述急救措施，可使悬浮于水中的有机微烂和腐殖质迅速沉淀，减少溶氧消耗，缓解浮头。

农博

鼻出血等症者也要忌用。

挑选荔枝小技巧

新鲜荔枝应该色泽鲜艳，个大均匀，皮薄肉厚，质嫩多汁，味甜，富有香气。挑选时可以先在手里轻捏，好荔枝的手感应该发紧而且有弹性。从外表看，新鲜荔枝的颜色一般不会很鲜艳。如果荔枝头部比较尖，而且表皮上的“钉”密集程度比较高，说明荔枝还不够成熟，反之就着一颗成熟的荔枝。如果荔枝外壳的龟裂片平坦、缝合线明显，味道一定会很甘甜。

中食

面/向/郊/区 服/务/农/业 做/农/民/的/朋/友