

上海旺园家禽养殖专业合作社

以人为本，以德为先
创建国内一流的家禽科技企业

地址：奉贤区奉城镇卫季村 1154 号
联系电话：021-57175121
手机：13901659483

东方城乡报
三农实用周刊
面向郊区、服务农业、做农民的朋友

[教你一招]



科学填鸭灵活掌握

开填日龄

一般在 40 日龄~42 日龄,体质量达 1.7 公斤以上的中雏鸭就可填饲。一般开填日龄早, 饲料报酬较好, 开填日龄过晚, 饲料转化率降低,经济效益差。但过早地填饲,由于雏鸭幼嫩,容易造成瘫痪和死亡。

填前准备

开填前将鸭按体质量和体质分群,挑选发育正常、健康状况好的鸭先开填。此外,填前可剪去爪尖,以免互相抓伤,影响屠体的美观,降低等级。

配制专用日粮

填鸭阶段的饲料营养应适当提高碳水化合物的比重, 降低粗蛋白质水平,要求代谢能为 12558 千焦/公斤, 含粗蛋白质 12%左右、钙 0.8%左右、有效磷 0.44%左右。所用的饲料必须粉碎得较细。由于填饲用的饲料主要是玉米, 加水调制后易沉淀,故饲料中必须加 10%~15%的小麦面粉起黏浆作用。

填饲操作要点

首先将调好的饲料装入填饲机的贮料箱内,转动搅拌机以免饲料沉淀。然后,将鸭慢慢赶入待填圈内等候填饲。操作人员先用脚踏填鸭机的离合器,检查出料情况,并调整出料量,达到规定数量后即可填饲。

填饲的时间和填饲量

通常每天填饲 4 次,每隔 6 小时填 1 次,每次的填饲量(指带水饲料的重量)约为鸭体重的 1/12,以后每天填饲量可增加 30 克~50 克湿料,1 周后,每次可填 300 克~500 克。在凉爽季节,鸭子消化好,可适当多填,应根据具体情况灵活掌握。

山农

[生猪行情]

肉猪价格(元/公斤)

闵行区:15.6
嘉定区:15.6
浦东新区:14.8-16.0
奉贤区:15.2-15.4
金山区:15.6
崇明县:15.6

(本期是 2014 年 9 月 12 日所采的价格。)

沪郊毗邻地区苗猪交易价(元/公斤)

嘉定区:27.0
浦东新区:25.0-26.0
奉贤区:24.0

(本栏目信息由上海市生猪业行业协会提供)

本版由上海市生猪业行业协会协办

全国秋季重大动物疫病防控工作视频会议强调

全力以赴做好重大动物疫病防控工作

近日,农业部召开全国秋季重大动物疫病防控工作视频会议,深入分析当前动物

疫病防控形势,安排部署秋冬季重大动物疫病防控工作。

今年以来,农业部和各级畜牧兽医部门紧紧围绕“两个努力确保”的总体防控目标,狠抓各项措施的落实,重大动物疫病防控取得显著成效, 小反刍兽疫疫情迅速得到有效控制, H7N9 流感剔除行动进展顺利,灾后动物防疫工作扎实有效。

会议指出,各地务必高度重视秋冬季防控工作,确保全面完成既定目标和任务。一要着力抓好基础免疫。秋季集中免疫工作 9 月 10 日全面启动,力争 10 月底完成,11 月中旬开展免疫效果评价。要加强疫苗质量监管,组织好疫苗的生产供应,保障秋防工作顺利进行。

二要着力做好监测预警。各地要围绕口蹄疫、禽流感、布病等优先防治病种开展监测,抓好马传贫、马鼻疽消灭工作。三要着力强化兽医卫生监督执法。进一步健全活畜禽跨省调运监管制度,强化证章标识管理。要以“提素质强能力”行动为契机,全面提升执法人员素质和能力。四要着力加强边境地区防控。坚持“内防外堵”,进一步细化、实化边境防控措施,构建边境地区“防堵带”。探索动物疫病区域化管理模式,大力推动无疫区和生物安全隔离区建设。五要统筹做好人畜共患病和常见病防控。切实抓好布病、血吸虫病、包虫病、狂犬病等重点人

畜共患病防治,统筹做好生猪腹泻等常见病防控,强化综合防疫管理,提高养殖场生物安全水平。六要着力做好各项应急准备工作。进一步完善预案,严格执行 24 小时应急值班和带班制度。一旦出现疫情,迅速启动预案,防止出现扩散蔓延。

针对当前动物防疫工作面临的新情况新问题,会议强调,各地近期要着力推进几项重点工作。切实抓好小反刍兽疫防控工作,抓紧制定实施消灭计划。强化 H7N9 流感防控,加快实施 H7N9 流感剔除计划, 统筹做好 H5、H7、H9 等亚型禽流感防控工作。加快推进病死动物无害化处理工作, 落实属地管理责任, 加快推动建立长效机制。抓好畜禽屠宰管理工作,加快推进职责调整,切实做好屠宰质量安全监管工作。

启文

秋风起,猪舍防寒防病加营养

秋季,对养殖户来说,是养猪的黄金时期。在此阶段,猪上膘较快,如果养殖户注重

防寒、防病、增加饲料营养及猪舍通风,猪的增重较为明显。

●防寒

从炎炎酷暑直接过渡到凉爽的秋天,气温下降较大,昼夜温差更是达到近 10℃,对猪的生长带来一定的影响。气温太高或太低,都影响猪的正常生长。其实只要采取适当措施,保持猪的适宜生长温度,猪在秋季也可以正常生长。

一是修整好猪舍, 把栏舍漏风的部位堵严, 遮挡物可因地制宜用草苫或塑料薄膜等,以防冷风侵袭猪舍。在猪舍内勤垫干草,不要让垫草潮湿。增加饲养密度,让猪挨着睡,既可互相取暖,又可提高栏温。二是多喂热能高的饲料,以增加猪体内的热量。三是有条件的养殖户可以在猪圈内避风一角建温室,温室须砌 1 米高左右的墙, 大小根据猪的数量而定,可留一小门让猪自由进出, 上部用稻草盖严,内铺稻草。气温寒冷的时候,猪会自动进入保温室避寒。

●防病

秋季猪易患附红细胞体病、猪链球菌病等疾病,会给养殖户带来很大的损失,建议用以下几种方法进行预防。

附红细胞体病。该病又称为红皮病,典型临床症状表现为母猪生产性能下降,仔猪体质变差、贫血、肠及呼吸道感染增加。育肥猪病初精神萎靡,体温升高到 39.5℃~42℃,颤抖转圈或不愿站立,离群卧地,出现便秘或拉稀。病猪耳、颈下、胸前、腹下及四肢内侧等部位皮肤红紫,指压不褪色。

治疗附红细胞体病可用血虫净(贝尼尔)、阿散酸配合长效土霉素,同时补充生血的药物或饲料添加剂。

猪链球菌病。该病继发混合感染多,猪患感冒后易继发。该病会使病猪体温升高到 41℃以上,减食或停食,结膜潮红,流鼻涕。部分病猪发生关节炎,跛行、爬行或站立。有的出现共济失调、空嚼磨牙等神经症状。病猪便秘后腹泻或便秘腹泻交替出现, 后期呼吸困难,常于 1~3 天内死亡。

治疗时要及早注射疫苗,猪链球菌已对多种抗生素产生耐药性,强效阿莫西林、氧氟沙星、恩诺沙星等能有效控制该病。

●增加饲料营养

秋季养猪,除加强常规饲料管理外,还要做好猪饲料的储备和育肥催肥工作。红薯、花生秧、豆秸等粉碎后或发酵后喂猪都是很好的



[生猪养殖]

饲料。

●加强猪舍通风

降低猪舍湿度、改善猪舍空气的最好办法是通风换气,而通风换气最有效的措施则是在天棚顶上个通风孔,这样不用开门窗就能尽快将舍内的大量潮气和不良气体排出,并换入新鲜空气。但通风要有节制,晴天、暖天多通风,阴天、冷天少通风,做到通风与保温协调。

曾玉露

[链接]

科学利用玉米喂猪

玉米是应用最广的饲料,但其营养成分比较单一,为了最大限度发挥玉米的饲喂功效,喂猪时必须注意以下几点。

糖化后饲喂。玉米粉经糖化后,能使部分淀粉转化成糖,可使猪喜食快长。其主要做法是,将玉米粉放入缸中,再倒入 2 倍快开的水充分搅拌成糊状,在其表面撒上 5 厘米厚的干粉,经过 3~4 小时即被糖化。

添加微量元素。玉米中矿物质元素含量低,故应在日粮中添加骨粉、磷酸氢钙和硒、铁、铜、锌、锰等微量元素。

添加维生素。玉米中维生素含量低,饲喂时必须加喂青绿饲料,可添加畜禽多种维生素。

[实用技术]

养好肉羊贴秋膘

4~6 次淡盐水。切忌让羊饮用死塘水、排灌水、洼沟水或让羊在潮湿泥泞的地方吃草、休息,以免引起风湿病。

夏季高温多湿,羊放牧归来后,因活动范围变小,容易造成圈舍潮湿和环境不良,往往会引起寄生虫病的发生,因此要注意羊舍的环境卫生、通风和防潮,保持羊舍清洁干爽,做好羊疥癣等寄生虫病的防治。日常喂给的饲料、饮水必须保持清洁。羊舍、运动场要经常打扫,并定期消毒。

上农

肉鹅 60 天出栏养殖法

1~20 天 重点是保温、开食、开水,做好雏鹅的培育工作。刚出壳的雏鹅要求有 28℃的生长温度,随日龄的增长,到 20 天时逐渐降到 20℃左右。出壳 3 天内就应使雏鹅学会吃食、喝水,饲料要求高粗蛋白质、高能量,配方百分比是:鱼粉 5、酵母 5、花生饼 20、玉米(2428,-1.00,-0.04%)52.6、麸皮 10、草粉 5、贝母粉 1、骨粉 1、微量元素添加剂 0.1、食盐 0.3。饲喂时搭配 20%-40%的青绿饲料。

21~40 天 抓好鹅的体格培育,每天都要有一定的外出放牧、

放水时间,拉伸骨架、增强体质。与第一阶段相比,饲料的营养浓度可降低,但要增加贝壳粉的比例,可占 6~8%,以力增加鹅的体格。

41~60 天 重点抓育肥,饲料以玉米、薯类为主,最好将饲料煮成半熟。根据个体大小,将强、弱鹅分开饲养,每天饲喂 4~6 次,其中夜间加喂 1 次。鹅吃完精料后,再喂少许青饲料,有利于消化。

经 60 天快速育肥,大型鹅体重可达 5.5~6 公斤,中小型鹅可达 3~4 公斤,可食部分占胴体重量的 60%以上。

朱文