

上海旺园家禽养殖专业合作社 以人为本，以德为先 创建国内一流的家禽科技企业

地址：奉贤区奉城镇卫季村 1154 号
联系电话：021-57175121
手机：13901659483

东方城乡报

三农实用周刊

面向郊区、服务农业、做农民的朋友

【教你一招】

家兔冬养重点在防寒

防寒保温
保温是冬季养兔的重中之重。要求舍内温度均衡，不能时寒时暖。温度若低于 5℃时，需要加强保温，室内笼养的兔舍门窗要封闭，室外架兔兔舍，要用泥墙堵严透风孔。舍门可挂草帘或棉帘保温。白天应使兔子多晒太阳，夜间应谨防贼风侵入。要常常检查产仔箱，多加柔软垫草，以防仔兔冻伤。应适当增加兔子的饲养密度，小兔切莫单笼饲养。

调整饲料
冬季气温低，家兔热量消耗大，因此，不论成、幼兔，应补喂一些含能量高的精饲料，如玉米面和煮熟的红薯、马铃薯等饲料，最好用热水拌料。冬季青饲料缺乏，为防止家兔患维生素缺乏症，天天应补喂胡萝卜、白萝卜及菜叶等多汁饲料。严禁饲喂冰冻饲料和带霜饲料，以防止家兔发生肠炎。

保证饮水
冬季饲喂干草较多，家兔易口渴，因此，必须保证饮水供给。成年兔应饮 15℃左右的井水，幼兔以饮温水为宜。

投喂夜草
冬季昼短夜长，而且家兔又有夜行及夜间采食的特性。因此，必须特别留意投喂夜草，并增加其投喂量，以提供较多的营养物质，来加强家兔的御寒能力，保持健康。

抓好繁殖
冬繁仔兔的成活率高、疾病少，但冬季繁殖有两大难题，一是温度低，二是维生素饲料不足。要解决这两大难题，首先要利用各种保温措施，使兔舍的最低温度保持在 5℃以上，并对产仔箱加强保温，其次要提供适量的维生素饲料，如胡萝卜、白菜、麦芽或芽菜等。

加强日常管理
保温会使兔舍密闭性增加，透风不良，有害气体增多，易诱发家兔患眼结膜炎、鼻炎及呼吸道等疾病。因此，晴朗的中午要打开门窗排浊气。要及时清理粪便，禁止往地面洒水，以减少兔舍温度和臭气。要常常留意检查和防治家兔的疥癣病。针对日照时间短，可通过电灯补加光照，使家兔每天光照时间达到 14~16 小时。

吴畔

【生猪行情】

肉猪价格(元/公斤)

闵行区:14.6
嘉定区:14.2
浦东新区:13.8-14.4
奉贤区:14.0-14.2
金山区:14.2
崇明县:14.3
(本期是 2014 年 12 月 5 日所采的价格。)

沪郊毗邻地区苗猪交易价(元/公斤)

嘉定区:21.0
浦东新区:20.0
奉贤区:21.0
(本栏目信息由上海市生猪业行业协会提供)

本版由上海市生猪业行业协会协办

全国畜禽屠宰监管暨生猪屠宰专项整治工作会议强调

强化畜禽屠宰监管守护“舌尖上的安全”

11 月 28 日，全国畜禽屠宰监管暨生猪屠宰专项整治工作会议在北京召开。农业部部长韩长赋作出重要批示，他强调，畜禽屠宰一头连着畜禽养殖，一头连着食品消费，是肉产品走上餐桌的关键环节，在保障食品安全工作中具有十分重要的地位。各级农业部门要勇于担当，敢于负责，全面贯彻落实十八届三中、四中全会和全国治理“餐桌污染”现场会精神，加强调查研究，加强法规标准建设、加强监管执法，努力确保人民群众“舌尖上的安全”。农业部副部长于康震出席会议并讲话。

于康震指出，畜禽屠宰监管职责调整是国务院深化机构改革和职能转变的重要内容，各级农牧部门要从保障食品安全、全面推进依法治国的大局认识畜禽屠宰监管工作的重要性、

紧迫性，高度负责、毫不懈怠地抓好畜禽屠宰监管和生猪屠宰专项整治工作，努力确保不发生屠宰环节重大畜禽产品质量安全事件。

于康震要求，畜禽屠宰监管要以保障畜禽产品质量安全为根本目标，以优化布局、转型升级、规范经营、强化监管为首要任务，以推进工业化屠宰、品牌化经营、冷链化流通、冰鲜化上市、一体化管理为主攻方向，不断增强畜禽屠宰监管能力，加快建立肉品质量安全保障体系。要始终坚持确保不发生屠宰环节重大畜禽产品质量安全事件这“一个目标”不动摇，要突出抓好畜禽屠宰产业发展和行业监管这“两个重点”工作，推动落实地方政府属地化管理责任、部门监管责任和屠宰企业质量安全主体责任这“三个责任”，进一步强化屠宰企业设立审

批管理、宰前检疫、屠宰过程质量安全控制和屠宰违法行为查处这“四个环节”。

于康震强调，“元旦”“春节”肉食品消费旺季即将来临，畜禽屠宰监管工作任务艰巨而繁重。各级农牧部门要履职尽责，加快推进市县屠宰监管职责交接，建立健全畜禽屠宰监管体系；全力抓好生猪屠宰专项整治，坚决打击私屠滥宰等违法行为，确保猪肉消费安全；加强法规标准和行业规划制修订工作，提高屠宰监管法治化、规范化水平。

中央编办、国务院法制办、财政部、公安部和农业部相关司局、单位负责人以及来自全国各省、自治区、直辖市畜牧兽医主管部门和动物卫生监督机构的 100 余位代表出席会议。

龙新

给病猪喂药的四种方法

猪患病后，恰当地选择喂药方法，不但可以提高药效，缩短疗程，使之快速痊愈，而且还可减少药物浪费，节省药物开支。

●口腔投药法

首先捉住病猪两耳，使它站立保定，然后用木棒或开口器撬开猪嘴，将药片、药丸或其他药剂放置于猪舌根背面，再倒入少量清水，将猪嘴闭上，猪即可将药物咽下。这种投药方法限于少量药物，若喂大量药物，则应采取胃管投药。

●经鼻投药法

将病猪站立或横卧保定，要求鼻孔向上，紧闭嘴巴，把易溶于水的药物溶于 30 毫升至 50 毫升水中，再将药水吸入胶皮球中，慢慢滴入病猪鼻孔内，猪就一口一口地把药水咽下。这种方法简单易行，大小猪都可采用。量大或不溶于水的药物不宜采用此法。

●胃管投药法

将猪站立或横卧保定，把头部固定，使之不能自由活动。用开口器将猪嘴撬开，把胃管从舌面迅速通过舌根部插入食管中。当胃管确定插入位置无误时，即可注入事先溶解好的药物。灌完药后再向管内打入少量气体，使胃管内药物排空，然后迅速拔出胃管。检查胃管是否插入食道的方法：一是用压瘪的胶皮球连在胃管的外口上，如果球仍然保持原状而不鼓起，将胶皮球充气向胃管打气而畅通无阻，即证明胃管已进入食道或胃内。二是将胃管外口浸在水中，如果随病猪呼吸喷出气泡，则是插入了气管。如果无气泡发生，则是插入了食管。三是如果胃管插入了气管，则猪不叫或叫声低弱。如果胃管插入食管了，则叫声不变。

●灌肠法

就是将无刺激性的药物灌入病猪直肠内，由直肠内黏膜予以吸收。当猪患口腔疾病不易吞咽食物时，通常采用灌肠法给其补充营养。猪便秘时，也可以给其灌肠促进肠管内的粪便排出。治疗用的灌肠剂主要是用温水、生理盐水或 1%的肥皂水。灌注营养物时，首先灌注温水，把病猪直肠内的粪便排除后，再灌注营养物质。具体做法是：先把病猪保定好，将灌肠器



【生猪养殖】

涂上油类或肥皂水，再由肛门插入直肠，然后高举灌肠桶，使桶内的药液或营养液流入直肠。灌注以后，必须使病猪保持安静。当病猪有要排粪的表现时，立即用手掌在其尾根上部连续拍打几下，使其肛门括约肌收缩，防止药液或营养液外流。

曾玉露

【链接】

不要长期对畜禽饲用高锌日粮

国内外研究表明，动物对锌的正常需要量和中毒剂量之间范围很大，猪可耐受正常需要量的 20 倍~30 倍。同时耐受剂量还和添加锌源的形式有关，高剂量使用无机锌化合物(如氧化锌，硫酸锌)时，与有机锌相比，较不易引起动物锌中毒。在无机锌化合物中，应用氧化锌形式的高锌 (2000mg/kg~3000mg/kg)具有促进仔猪生长和预防仔猪断奶后腹泻的效果，其原因除了氧化锌本身具有收敛与弱抗菌作用外，可能与氧化锌的生物学效价比硫酸锌、碳酸锌、氯化锌低，较不易引起中毒有关。

但是，长期对畜禽饲用高锌日粮会给畜禽业发展和生态环境带来不良的影响，因而应予以高度重视。我国农业部规定，仔猪断

奶前后 2 周配合饲料中氧化锌形式的锌的添加量不超过 2250mg/kg。

氧化锌具有极强的化学活性，能与多种有机物发生氧化反应 (包括细菌内的有机物)，从而把大部分细菌、病毒杀死。

仔猪断奶后，所采食的饲料由液态变为固态，肠绒毛和肠上皮细胞受到严重损伤。氧化锌可通过影响胰岛素、锌指蛋白等生物活性物质的合成和水平，加强核酸与蛋白质代谢；另一方面，通过锌指蛋白促进肠绒毛和肠上皮细胞增生、分裂加快，快速修复因

仔猪断奶应激造成的肠道黏膜和绒毛损伤，有效治疗因断奶应激造成的胃肠道溃疡。同时抑制有害菌生长，维护肠道菌群平衡。

王琦

【实用技术】

初冬养鸡有讲究

温度
鸡舍内温度以保持在 18—23℃为宜，最低不应低于 15℃。如遇到刮风天气应摇起篷布，防止刮风使舍内温度骤降。每天根据天气情况和鸡群的表现调节进风口的大小，每天收看天气预报，以便提前做好预防工作。

通风
初冬季舍内以空气新鲜，气流速度较慢为好。入冬前把不应进风的地方修补好，尤其是排风扇处的漏风处必须处理好，防止因局部倒冷风，使鸡舍整体通风不畅和近排风扇处的温度偏低，造成鸡群发病而影响生产。当舍内氨气味较大时，应首先提高

舍内温度，然后加大通风量。早上舍内空气比较污浊时，若必须加大通风量，应逐渐增加，最好是在中午温度较高时进行，采用每次通风时间短些，多通几次的方式较好。

湿度
入冬前要加足垫料。冬季垫料比较干燥，要经常洒水或喷雾消毒。棚架下若有积水，在秋天气温高时要放出棚架下的水，然后撒上石灰。舍内温度适宜时，要加大通风量。把饮水线水压调低至 10 厘米以下，或把饮水器水位调至 1 厘米以下。经常检查饮水线，饮水器有漏水的乳头接头应马上更换或维修。

周飞

牛舍保温性能要好
牛舍要不漏雨、不透风、地面不潮湿、清洁卫生。室温要达到 5℃以上，最好要保持在 10℃ ~18℃。

科学配料精心饲喂
其日粮配方为：优质干草 10 公斤，酒糟 7 公斤，玉米面 3.5 公斤，豆饼 0.5 公斤，尿素 100 克，食盐 50 克。要先喂粗料后喂精料，少给勤添，每次喂八九成饱即可，有利于牛下一次饲喂时保持旺盛的食欲。

供给充足的饮水
冬季牛以吃干草为主，因此要供给充足的饮水。饮水不足，不但影响牛的采食，也影响肉牛对饲料的消化和吸收，使牛被毛、皮

肉牛增膘有妙招

肤干燥、精神不振。供给的水要清洁，温度要适宜，以 20℃为宜。

多晒太阳勤刷牛体
在风和日暖的中午，把牛牵出去晒晒太阳，同时要刷拭牛体。这样，既可预防皮肤病和体外寄生虫病的发生，还可促进血液循环，增强牛对寒冷的抵抗力。

补饲配合饲料效果倍增
玉米 10%、瓜干 10%、高粱 8%、油饼类(豆饼、棉子饼、花生饼等)10%、麸皮 60%、骨粉 1.5%及食盐 0.5%，将上述各种饲料粉碎后加水拌湿让其粘合，然后放在阳光下晒干即成为形状不规则而且不太结实的颗粒配合饲料。

张盼