上海旺园家禽养殖专业合作社 以人为本，以德为先 创建国内一流的家禽科技企业
地 址：奉贤区奉城镇卫季村1154号
联系电话：021-57175121
手 机：13901659483

东方城乡报 三农实用周刊 面向郊区/服务农业/做农民的朋友

[教你一招]

养鸡场疫病防控技巧

饲养管理

饲料要全价、无霉变，喂料要均匀，最好经过消毒处理。饮水卫生尤其重要，要定期对密闭水线用酸类消毒剂浸泡、冲洗，定期监测鸡饮用水的卫生状况，不合格的立即采取措施。鸡舍应保证通风和温度正常，当温度高湿度大时，容易形成闷热环境，对鸡的生长不利，应注意在高温和低温情况下温度和湿度之间的平衡关系。垫料潮湿容易产生病菌和诱发虫卵繁殖，所以垫料要保持干燥。鸡舍内清理出的粪便最好经过堆积发酵处理，工厂化养殖企业可采用鸡粪发酵生产沼气或发电来处理粪便。

疫病控制

感染了细菌性疫病，可能是饮水受到了污染，要加强对水源的消毒，同时通过药物敏感试验选择敏感性药物。对于病毒性疾病，通过制定适合本地区的免疫程序，按时免疫接种，定期监测抗体水平，抗体达不到保护水平时，紧急免疫接种来控制。当有疫情发生时，需根据具体疫病采取相应措施。对于寄生虫性疾病，主要是平养鸡的球虫病，通过球虫疫苗免疫来解决，经过球虫卵囊在鸡体内循环3~4个周期后，可以产生坚强的抵抗力。

目前动物疫病虽然发病种类及疫病表现形式增多，但仍以传统疾病尤其以病毒性传染病为多，禽流感、新城疫、法氏囊病、传支、传喉及减蛋综合症等仍是流行的主旋律；非典型疾病流行广泛，随着病原的变异，老病非典型化越来越多，尤其是老养殖区表现更加明显，各方面症状都不典型，给诊断和治疗带来很多障碍；病毒病与病毒病、细菌病与病毒病等混合感染情况非常普遍，且日趋严重，很少见到单纯性疫病发生；细菌耐药性现象严重，所以严格执行生物安全制度，加强防控，才能有效防止鸡疫病发生。

黄林杰

减免行政事业性收费 小微兽药企业获益

近日，财政部、国家发展改革委联合发布了《关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》。通知指出，为进一步减轻企业特别是小微企业负担，经国务院批准，将取消、停征和免征一批行政事业性收费政策通知，涉及动物产品检疫、新兽药审批等内容。

通知指出，自2015年1月1日起，对小微企业(含个体工商户)免征42项中央级设立的行政事业性收费。各省(区、市)要对小微企业免征省级设立的行政事业性收费，具体免征项目由各省(区、市)人民政府确定。免征有关行政事业性收费的小微企业范围，由相关部门参照《中小企业划型标准规定》具体确定。

按照中小企业划型文件要求，农、林、牧、渔业行业企业，营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

此次，对于小微企业免征的行政事业性收费项目中，包括动物及动物产品检疫费，新兽药审批费，《进口兽药许可证》审批费，《兽药典》、《兽药规范》和兽药专业标准收载品种生产审批费，已生产兽药品种注册登记费等五项。

通知强调，取消、停征和免征上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行职能所需经费，由同级财政预算予以统筹安排。其中，行政机关和财政补助事业单位的经费支出，通过部门预算予以安排；自收自支事业单位的经费支出，通过安排其上级主管部门项目支出予以解决。各级财政部门要按照上述要求，妥善安排有关部门和单位预算，保障工作正常开展。

通知还指出，对上述取消、停征和免征的行政事业性收费，各地区和有关部门不得以任何理由拖延或者拒绝执行，不得以其他名目或者转为经营服务性收费方式变相继续收费。

章勇

活猪长途运输的注意事项

为了能够买到健康放心的猪只、避免运输途中猪只产生应激、挤压，确保运输到场后猪只健康成长，活猪长途运输需要注意以下几点：

●运输前注意事项

选择适宜的季节和起运时间。春秋季节气候温和，是运输活猪的最佳季节。冬季应做好保暖措施，在车厢铺满稻草，车外包上棉被，多选择白天运输。

运输车辆。首先，要选择与活猪运输量相适应的运输工具，选择的运输车辆大小要合适，并且车厢应安有笼子，笼子应分成小格，每格只装3头~4头猪。其次，车厢应通风良好，所以车辆应敞篷，护栏最好为栏栅式。为预防下雨或夜间温度降低，还应备有篷布。再次，为了避免猪只打滑，车厢可铺上垫草或草木灰。最后，猪只运输车辆长期运输活猪，易带多种传染源，应在装猪前用5%福尔马林、5%的“百毒杀”或3%~5%的热氢氧化钠溶液对运输车辆进行彻底消毒工作。

正确选择猪只。健康无疫病的活猪是保证长途运输经济效益的基础。生猪处于饱食状态时，不宜立即装车起运，在休息1小时~2小时后方可起运。在体型大小相当的前提下，尽量把同一窝的猪装在一起。

●运输途中注意事项

运输路线。避免道路崎岖或堵车拉长运输时间，应尽量行驶高速公路；刚开始时应控制车速慢行，待猪适应后再以正常速度行驶，尽量避免出现急转弯或急刹车的现象；在经过有疫情的地区少停车，避免感染疫病。

应激处理。在运输途中生猪每天至少适量饲喂2次易消化饲料，同时饲喂1次含有电解多维、葡萄糖或补液盐的干净饮水。在夏季运猪时，由于受外界气温和运输车厢内水分、粪尿蒸发的影响，往往在车厢内易形成高热、高湿的小气候，引起生猪体内积热，且散热困难，如不采取应对措施，常因出现脱水、心力衰竭、肺瘀血、肺水肿、消化机能减退等症状而死亡。

炎热时要用干净水多次喷洒猪体，对于出现全身震颤、高热的猪只，可肌内注射盐酸氯丙嗪每公斤体重23毫克。冬季气温低时要防止猪只相互挤堆，避免造成伤亡事故。发现猪只打堆应及时赶散，对一些烦躁不安的猪可以注射少量的镇静剂，以防止互相打架造成损伤。

●运输后注意事项

到达卸车点后马上卸车，在保证轻抓轻放的同时，控制卸车总时间。经过长途运输的猪会有一定的掉膘，猪必须经短期调养，待基本恢复体膘后才能上市。外购活猪到场之前，必须对隔离舍及用具进行严格消毒。根据猪体重和健康状况合理分栏，尽快供给清洁饮水。猪休息1小时~2小时后可适量饲喂稀薄饲料，随着猪体的恢复，喂料量要适当增加，对拉稀、不采食或精神萎顿的猪，要及时检查治疗。对体温升高、疑有传染病的猪要单独隔离观察，并注意搞好猪舍的卫生、通风、保暖等设施，隔离观察半个月后，如没有疾病方可进入生产区。

[养殖园地]

陈南

[链接]

断奶仔猪日常饲养要点

转入仔猪要特护，少喂勤添，保持饲料新鲜，前3天适当控料，以后自由采食，每天添料4次。

保持饲料新鲜清洁，不用发霉变质饲料，及时清理料槽内剩余饲料。定期检查饮水器，保证为仔猪提供新鲜清洁的饮水。

严格饲喂标准、防疫程序，降低发病率，提高仔猪体重。

保持圈舍环境卫生，注意舍内有害气体浓度，按季节温度的变化，做好通风换气、防暑降温及防寒保温工作。

保持舍内卫生，加强猪群调教，训练猪群吃料、睡觉、排便“三定位”，尽可能不用水冲洗有猪的猪栏。

合理分群，遵守“留弱不留强”，“拆多不拆少”，“夜并昼不并”的原则，及时调整猪群，保持合理的密度，同时对并圈的猪喷洒药液，减少相互咬架而产生应激。

过好“断奶关”，在技术员的指导下，饲料中适当添加一些抗应激药物如VC、多维、矿物质添加剂等。

陈林

[生猪行情]

肉猪价格(元/公斤)

闵行区：14.0
嘉定区：14.0
浦东新区：13.8-14.1
奉贤区：13.6-14.0
金山区：13.9
崇明县：14.0

(本期是2015年1月23日所采的价格。)

沪郊毗邻地区苗猪交易价(元/公斤)

嘉定区：24.0
浦东新区：20.0-21.0
奉贤区：21.0

(本栏目信息由上海市生猪业行业协会提供)

本版由上海市生猪业行业协会协办

[实用技术]

鸭子感冒该咋办

细观察

病鸭赶群活动时不愿动，出栏晚，下水慢，吃料落后、呆立。个别鸭眼流泪，有的一侧或两侧肿胀，时间长了眼干枯或瞎眼。粪便有绿色，也有黄色，还有未消化的饲料渣，严重的产蛋下降30%。

检病理

病鸭气管有典型的出血，肝肿大，脾萎缩，小肠黏膜有出血斑，泄殖腔条状出血。生殖系统以充血为主，卵子变形，卵膜出血，子宫淤血。

巧诊断

无菌采取肝、脾抹片，革兰氏染色，排除细菌感染；无菌取胸腺、淋巴、脾脏研磨，加5倍生理盐水和2000单位链霉素冰箱冷冻，取上清液0.1毫升接种9~10旧龄鸡胚，做病菌分离鉴定。

早预防

开产前做好疫苗接种，如减蛋综合症，类减蛋综合症和鸭瘟疫苗注射。入冬前做好卫生消毒，可用百毒杀等消毒液饮水消毒。做好防寒保暖。在活动场地覆盖塑料大棚，提高活动场地的温度，适当安排排水清池。

重治疗

如发现一两只鸭有感冒症状，马上投药治疗，可减少损失。其治疗方法为：每公斤饲料中加入0.6克病毒灵片、1克复合维生素B粉，连喂5天；每50公斤饲料中加草药炎瘟清1袋，连喂4天，同时饮水中加入病毒唑，每日2次，连饮4日。

龙冬初

羊越冬期饲养

备足饲草

1只成年羊一冬至少要按400公斤干草储备，保存好各种农作物秸秆，充分利用酒糟、干菜以及其他农副加工产品。

合理搭配

饲料无论是放牧或舍饲，越冬期都要提高羊的饲料营养水平。对放牧的羊要早晚进行补饲，一般每只成年羊每天补饲青干草1公斤左右、精料0.3~0.5公斤；对怀孕后期母羊的补饲量要加倍。除此之外，每天还要补饲骨粉5~7克、食盐5~10克。

精心护理

羔羊对放牧羊群中的母羊，产前1周应在近处放牧，昼夜要注意细心观察，防止母羊圈外产羔。产房要设在背风向阳处，其温度要保持在8℃~10℃，产后1小时内辅助羔羊吃到初乳。对因照顾不周被冻僵、嘴紧闭不能吃奶的羔羊，可将其放在暖炕上或放进40~43℃的温水中，待其暖和过来再让其吃奶。羔羊出生后5天左右可离开产房，白天母子分开饲养，定时喂奶，晚上合群。在天气晴朗的中午，可让羔羊晒晒太阳。

注意加强管理

在大风雪天气不要放牧，风雪过后注意不让羊吃带冰、雪草；舍饲时晚上要开灯，增加羊的吃草时间，有条件的最好给羊饮温水，对密闭的羊舍要注意通风换气，天气晴好时要让羊多晒太阳，并进行适当运动。

王静