

搞好蔬菜种植 加强田间管理

当前本市地产蔬菜种植管理要点

入冬以来，本市气温显著下降，寒流开始频繁来袭，蔬菜生产产区要抓住有利气候加速冬播进度。此外，要做好部分蔬菜品种的推迟上市工作，以满足一、二月淡季的蔬菜供应。

蔬菜苗情

- 1、绿叶菜：“五月慢”青菜、“迟花”芥蓝等继续播种育苗；春秋二青皮、种都系列等晚春茼蒿品种可在大棚内分期分批播种育苗。
- 2、继续做好茄果类蔬菜的育苗工作。露地茄子、辣椒一般在当年12月上旬播种；小环棚番茄，上月中旬大棚内播种育苗。
- 3、其他可播种的蔬菜：“湖月”、“四季获”等平头型春甘蓝一般在上旬播种结束；“白阳”、“雪山”等春花菜品种可继续播种，且在上旬较为适宜；春季绿花菜下旬开始陆续播种，可选择早熟、生长期短、抗病、高产的“优秀”等品种；大棚嫁接黄瓜，接穗黄瓜和砧木南瓜播种结束，并开始嫁接；马铃薯春季大棚栽培，可在上旬播种，品种可选择克新四号、克新一号等。

- 4、做好冬春蔬菜的定植：“四月慢”青菜、春卷心菜（“尖头”品种）等在上月内继续定植。芹菜、塌棵菜、芥菜、早春茼蒿、洋葱等一般在上旬结束定植；秋冬生菜在中旬结束定植，但气候较暖年份，定植期可适当延后。

蔬菜田间管理

- 1、继续加强大田蔬菜的防寒防冻工作。寒流侵袭前可用无纺布、遮阳网、薄膜等进行覆盖，寒流过后要及时拿去覆盖物，天气回暖解冻后，要及时浇水。韭菜等蔬菜用塑料小环棚覆盖。茭白田要除尽老叶、削平茭墩，然后放水。
- 2、做好茄果类蔬菜秧苗的防寒保暖工作。育苗期间注意时刻关注天气预报，遭遇极端低温天气时，应及时搭建小拱棚，并加



盖塑料棚膜或其它保温材料来进行保温，确保苗床夜间温度不低于10—15℃，以防秧苗受冻及早春畸形果的发生。同时应该根据天气情况灵活揭盖保温膜，避免出现秧苗徒长、高温烧苗等情况。

- 3、大田栽培的大葱要及时培土，并做好上市准备。此外，为满足一、二月淡季的蔬菜供应，增加收益，耐寒性较强的卷心菜、胡萝卜、慈姑等可有计划地推迟采收上市。

孔令娟 周京一

培养树体骨架 调整树体结构 改善光照条件

做好果树冬剪 有助桃梨稳产

果树冬季修剪又称为休眠期修剪。果树通过冬剪，培养树体骨架，调整树体结构，改善光照条件，有助于达到早产、稳产、优质和便于管理目的。

一、桃

- 1、自花不孕的旺树宜轻剪，多留结果枝。修剪时宜剪强枝，疏细弱枝，多留结果枝；轻剪长放，中短果枝适量多留。
- 2、坐果率高的中熟品种宜中短截为主。适当疏留果枝，长果枝留8~10芽，更新枝留3~4芽，适量疏去一些中短果枝。
- 3、树势中等的桃树修剪宜重结合。应采用长放、短截结合，轻剪、重截结合，在内膛中下部适留更新枝，防止中、下部位空壳。
- 4、弱树修剪要回缩、重截，维持产量、

更新复壮。对已趋老化衰退的桃树主枝、侧枝，要回缩；加重修剪量，轮换更新，保留有结果能力的枝组，尽量利用可供更新的粗壮枝，叶从枝填补缺新枝，并加强肥水管理，增施有机肥，在保持一定的桃子产量的同时，达到树冠更新复壮的目的。

二、梨

- 1、初果期树。要继续扩大树冠，尤其是要注意对结果枝组的培养和修剪。在幼树阶段未经修剪而长期放任生长的树，要因树做形，逐年改造，合理调整树形结构。
- 2、盛果期树。要通过修剪保持主、侧枝的正常生长，进行结果树枝组的轮换更新修剪，复壮结果枝群，以求高产稳产。
- 3、衰老树。梨树潜伏芽寿命长，采取短



截容易生长徒长枝，可以对骨干枝进行一次更新，逐年进行调整，以恢复其正常生长。

上海地区果树冬剪最佳时期为当年12月份中旬至翌年1月底。同时做好果园清园与间伐工作。

嘉依

野芥菜的人工栽培技术

时则生长缓慢。野芥菜按叶型可分为板叶型和花叶型，可以根据栽培季节选择不同的类型。初次栽培野芥菜，可从野生植株上采集种子。其栽培要点是：

栽培季节与栽培方式

春季栽培2~4月播种，应用抽薹较晚的花叶型。早春气温低时可覆盖地膜，出苗后揭膜，或用小拱棚保温。夏季栽培6~8月播种，宜用板叶型。因夏季气温高，须用塑料遮阳网覆盖降温，并可防止暴雨冲刷。晚秋栽培9~10月播种，用花叶型和板叶型均可。野芥菜可单作或与其他蔬菜混作或间作。单作要做高畦，撒播。因其种子细小，可拌细

土后播种。

田间管理

生长期间浇水宜用细水喷洒。出现2片真叶时追施蔬菜专用复合肥或尿素。采收前7~10天追一次尿素，每次采收后都应追肥一次。注意防治霜霉病及蚜虫等。

采收与留种

植株具10片叶以上或根部直径为1厘米时用小刀挖出，尽量采大留小。育种栽培10月播种，翌春开花结实。由于种荚成熟后易开裂，所以必须在其转黄时收割，晾干脱粒后即可留种。

依技

早旺心花椰菜种植方法

早旺心花椰菜的特性：耐寒性强。植株高80厘米，开展度90厘米，外叶较多。叶呈长椭圆形，叶长58厘米，宽22厘米，叶缘波状，叶面微皱，蜡质较重。叶色深绿，叶脉绿白色。花球横径18厘米，球高14厘米，花粒较粗。球重1000~1200克，球黄白色，品质中等。全生育期220天左右，定植至采收始期160天。一般亩产1000~1300公斤。其栽培技术要点：

播种、定植

上海地区一般7月上旬播种育苗，苗龄

50天，8月下旬定植，定植畦宽150~170厘米连沟种2行，株距55厘米，苗龄1500株左右。定植田块施足基肥，定植活棵后及时追肥2~3次。

田间管理

该品种越冬前发好棵，冬前做好清沟壅土工作。小雪前重施越冬肥，小寒前后及时做好春肥腊施工作，因此时正值花球形成初期，用肥宜重，以利提高球重，增加亩产。

采收

翌年2月下旬至3月中旬收获。

金科



野芥菜味道鲜美，营养丰富，是人们喜食的野菜之一。野芥菜生长期较短，人工可多季栽培，连续采收，起着补充、调节、丰富蔬菜市场的作用。野芥菜在15℃左右和良好的光照条件下生长迅速，气温在22℃以上

东方城乡报

三农实用周刊

面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

【蔬菜病虫害诊断与防治】

黄瓜灰霉病

(接上期)

【发生规律】

病菌以分生孢子、菌丝体或菌核随病株残余组织遗留在田间越冬。在环境条件适宜时，分生孢子借气流、雨水飞溅、农事操作及病、健部间的接触等，传播蔓延至寄主植物上，从伤口、薄壁组织侵入，残花是最适合的侵入部位，引起初次侵染，并在受害的部位产生新世代分生孢子，进行多次再侵染，加重危害。

病菌喜温暖潮湿的环境，适宜发病的温度范围为2℃~31℃；最适宜的发病环境温度为18℃~25℃，相对湿度持续90%以上；最适宜的感病生育期为开花结果期；发病潜育期5~10天。

上海及长江中下游地区黄瓜灰霉病的主要发病盛期在3~6月、10~12月。年内以春季发生重，秋季有少量发生。年度间早春多雨、光照不足、低温高湿，或梅雨期间多雨的年份发病重；秋季多雨、多雾的年份发病重。田块间连作地、地势低洼、排水不良的田块发病较重。栽培上种植过密、通风透光差、肥水施用过多（由于病菌萌发芽管需要有水滴，故瓜类有生物水或露水时感病率最高）、棚室通风换气不足、平均温度在15℃左右、长势衰弱、抗病能力差的田块发病重。

【防治措施】

- (1) 茬口轮作：发病重的地块，提倡与水生蔬菜或禾本科作物轮作2~3年，以减少田间病菌来源。
- (2) 苗床管理：幼苗期加强苗床管理，要小水勤浇，控制苗床湿度，并在寒流侵袭之前注意做好保温措施。
- (3) 加强田间管理：提倡深沟高畦、地膜栽培，合理密植。保护地栽培棚内适时通风换气，晴天尽量增加开棚通风换气，阴天也应适当短时间开棚换气，降低空气湿度，减少顶棚滴水。并经常注意疏通棚四周的沟系，防止雨后积水和降低地下水位，棚内浇水施肥要小水少肥勤浇，控制湿度，防止大水大肥引发病害。

(未完待续)

清算公告

上海鼎隆纺织原料有限公司股东会按照《公司法》和公司章程的规定一致决议，公司终止经营,进入法定清算程序。公司已成立清算组。为保护债权人的合法权益，请所有与本公司有债权关系的单位及个人，自2015年12月3日公告见报日起45日内向本公司清算组申报债权，逾期不申报视为放弃债权,特此公告(此公告为第二次公告)。

联系地址：上海市青浦区华新镇白马塘村

清算组联系人:穆肖伟 杨海祖

联系电话 :13909986097 13801647723