



源自大自然的馈赠

享受生活 选择丰美

绿丰果园 上海丰美果蔬专业合作社

地址：崇明县横沙乡育贤南路1068号

电话：021- 56899531

手机：15026998996

联系人：陈先生

网址：www.fengmeishan.com

经营范围：

“真”开心土地领养；林地鸡鸭鹅；特色农家乐；各类绿色有机蔬菜、大米；田园风光游等等

坚持打造绿色原生态种植环境

“真”开心农田 诚邀你的加入



东方城乡报

三农**实用**周刊

面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

【热线答疑】

茄子嫁接砧木种子怎样育苗？

来自上海市浦东新区的许女士致电上海三农服务热线,询问茄子嫁接砧木种子怎样育苗？

春季桃树缩叶病如何辨别与防治？

问：开春季节，桃树病虫害开始多起来了，桃树缩叶病如何辨别与防治？

答：春季桃树常会出现嫩叶刚伸出时就显现卷曲状。随着叶片生长，卷曲及皱缩的程度随之增加，致全叶呈波纹状凹凸，叶色多呈淡绿至红褐色，这有可能是得了桃缩叶病。

桃缩叶病的病原菌以子囊孢子或芽孢子形态存在于树皮或芽鳞片上。发生与春季桃树萌芽展叶期的天气有密切关系，低温、多雨、潮湿的天气延续时间长，发病状况就会较重，若早春温暖干旱，发病相对较轻。然而上海地区每年这个阶段的天气常常是前者而不是后者，所以缩叶病防治不可掉以轻心。

防治办法：

1.鉴于中、晚熟品种较早熟品种发病轻，建议新桃园选用高产抗病的品种。

2.老桃园利用秋冬季节，抓紧清理果园、疏通沟渠、整形修剪以改善果园通风透光条件，施用有机肥以增强树势和抗病性。

3.药物防治：抓住早春桃树花芽露红尚未绽放时，用1:1:100的波尔多液或3~5波美度石硫合剂喷雾，可起到较好效果。

另在生产实践中，早春桃树上较多蚜虫出现也会有类似缩叶病症状，那可能是蚜虫侵害所致而不是病菌所致，防治药剂应选用杀虫剂而不是杀菌剂了。

怎样分株繁殖兰花？

问：怎样分株繁殖兰花？

答：兰花人工栽培过程中，主要有分株繁殖、种子播育和组织繁殖三种方式。其中分株是传统的繁殖方法。根据兰花种类不同，一般每隔2~3年进行分株一次，春秋两季都可以进行。春季3月至4月较适宜，秋季可在10月份进行。

分株方法：在分株前一段时间要控制水分，保持盆土湿润。选择生长健壮的母株，一般春兰每丛7~10筒，蕙兰每丛10筒以上为宜。选好母株脱盆时，可将兰株从盆中轻轻脱出，将泥坨侧放或平坐在地，除去根部泥土，用剪刀小心修除枯叶及腐烂的根。操作时，剪刀要横剪，不要直剪，以免伤害健康的根、叶和幼芽。修剪好后，再用小刷洗刷假鳞茎和根部的土。刷时勿用力过猛，以免损伤根芽。然后用40%甲基托布津或百菌清800倍液消毒后，放置在阴凉处晾干。等根部发白变软时，用剪刀在假鳞茎间处剪开，切口处涂上草木灰，以利防腐，再种植盆内。

上海三农服务热线供稿

接砧木种子怎样育苗？

针对此问题，热线专家表示，嫁接苗是通过瓜菜嫁接育苗技术，就是“移花接木”，把一种瓜菜的枝条或嫩芽（称“接穗”）嫁接在另一种瓜菜植株（称“砧木”）上，合二为一造就出了一个新的植株。

除了西瓜，现在不少农民种茄子、番茄都用嫁接苗，特别是茄子主产区，由于多年种植，土壤连作障碍日趋严重，茄子黄萎病、青枯病的发生逐年加重，导致减产严重，影响蔬菜产业健康发展。利用嫁接技术可有效克服茄子黄萎病、青枯病，茄子嫁接换根栽培后植株根系发达、长势好、采摘期长，优质品比例显著提高，产量大幅增加。

一、砧木育苗

1.砧木品种：托鲁巴姆。赤霉素10毫升1瓶+15公斤水，浸12小时，待用。

2.播种准备：用育苗盘装入培养土，浇水后放入苗床，早接穗苗15天左右，将种子均匀撒入土上，注意种子不应重叠为好，覆土1厘米左右，于最适宜的25℃~28℃之间育苗。

二、苗期管理

1.幼苗管理：出苗80%左右适时揭膜，齐苗后预防一次苗期病害，药剂可用恶霉灵等，忌大水、冰水喷。

蔬菜补充锌肥记住三个“不要”

锌是蔬菜生长发育必需的微量元素之一,许多蔬菜施用锌肥都有明显的增产效果。如番茄、大白菜、茄子以及豆科蔬菜,均为喜锌蔬菜,施用

锌肥既可提高产量,又能改善品质。并且合理使用锌肥对防治病毒病能起到一定的辅助作用,所以锌肥的使用不容忽视。

土壤中

土壤中的锌元素含量较少，一般不能满足农作物生长发育的需要，必须通过施肥来补充。尤其是我国北方地区，碱性土壤较多，这一类土壤的pH值较高，相对就降低了锌的有效性，非常需要补锌。

当然，蔬菜生产虽然需要补锌，但并不是意味着锌肥的用量越多越好。菜农在给蔬菜补充锌肥时一定要记住“三不要”。

不要施用过

锌肥之所以是微肥，是作物对它的需要量较少，施用量过大会对作物产生毒害作用（有些菜农在底肥时施用硫酸锌3公斤，后期叶面还频繁补充锌肥，亩用硫酸锌达到了250

克）。导致作物生长停滞、叶片小而薄，影响正常的光合作用。

不要在底肥中连续施用

锌肥做底肥一般有效期很长，一次施用，可持续1~2年。除了严重的缺锌土壤外，建议锌肥要每年施用一次即可。但在实际生产中，菜农在每茬蔬菜定植前，都会底施锌肥，导致一年内锌肥底施两次，使得土壤中残存锌肥量过大，而抑制土壤对其他元素的吸收。

不要与碱性肥料、碱性农药混用

锌与碱性肥料混合，会发生反应而降低肥效。同样，锌与碱性农药混合后，锌的有效性

2.搭秧：用培养土制作育苗钵，浇水后待用。当子叶放开时及时进行搭秧。育苗钵都按（8~10）×（8~10）厘米排列，浇水。

3.嫁接准备：在接穗一叶一心时进行。

三、嫁接后管理

1周内管理至关重要，嫁接后的3天内保持适宜的温湿度（20℃~25℃、50%~70%水分），完成愈合期的苗子管理，之后按常规管理即可。

上海三农服务热线供稿



和农药药效也随之降低。而且锌肥若与磷肥混合施用，则容易形成磷酸锌沉淀，不仅降低锌的有效性，而且也降低磷的肥效，所以二者切忌同时使用。

所以，锌肥作基肥时，不论是一大茬蔬菜，还是一年多茬栽培，一年底施一次即可。根据土壤缺锌程度不同，作基肥时每亩施硫酸锌0.5~2公斤。作追肥时每亩用硫酸锌0.75~1公斤掺适量细土撒施；叶面喷施，则每亩用硫酸锌90~180克对水60公斤于晴天喷施。使用时，最好是单独使用，以免与其他化学肥料发生反应，影响作物对锌的吸收。

孙淑丽

某些食材，天生就是健康的调味料

“味之美在调、调之妙在料”，美味佳肴离不开调味品。虽然味道好了,但人工合成的调味剂吃多了对身体并不好。其实很多小水产、蔬菜水果都是天然且健康的调味品。不妨自制天然调味品,一起品尝食材之鲜。

鲜香味美

小银鱼在冬季产量最丰，正适合初春食用。其光滑无鳞，是高蛋白低脂肪的佳品，常吃有利于增强免疫力。将银鱼干小火慢烘，扔掉炒出的杂质，放入搅拌机打成末，装入密封瓶保存使用。除了可以增鲜，银鱼粉还有些许黄瓜的清香味道，适合做成疙瘩汤、海带汤、大酱汤等。

作为春季一款不错的养生菜，茼蒿有蒿之清气、菊之甘香，吃上一口唇齿留香、回味悠长。不仅气味独特，茼蒿含有的茼蒿精油是特有的药效成分，可促进血液循环，辅助降压，增进食欲。茼蒿余汤或凉拌有利于开胃清肠，与豆腐同吃，与肉或蛋同炒，营养更为出色。

咸香适口

由于钠含量非常丰富，芹菜和冰草这两种蔬菜用来凉拌时，可以完全不用放盐。

芹菜光滑脆嫩，水分充足，有着特殊的香气，是适合春季养肝的优质蔬菜。其富含粗纤维和钠元素，有助于清热利水、解毒消肿，且能促进胃肠道蠕动，缓解便秘、预防结肠癌的发生。凉拌、清炒都非常合适。

冰草作为一种野菜，富含天然植物盐、氨基酸、胡萝卜素等矿物质。其晶莹剔透，爽脆多汁，既可解渴，又补充了营养盐分，一般可以加上青芥末汁调味做成沙拉。

甜甜蜜蜜

甘蔗汁多甘甜，水分含量高，蔗糖、葡萄糖及果糖含量更是高达12%，对于大便干结、小便不利、反胃呕吐、心烦口渴有好处。将甘



蔗榨成果汁，在做甜汤或其他点心时用来代替白砂糖。五六月份上市的荔枝也是很好的甜味食材。

酸酸爽爽

西红柿酸甜适口，富含的番茄红素、维生素C在美容养颜、延缓衰老方面有积极的作用。烧鱼炖肉时加上几片，或榨成番茄汁使用都行。虽然酸味不及柠檬，但是增酸提味的效果和柠檬比起来不相上下。

沈伟