

东方城乡报

三农实用周刊

面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

【教你一招】

母猪产前要控料吗？

很多人在讨论产前怎样给母猪减料,什么时候减料? 这里先来看一下母猪产前如果吃得太多,或者吃得太少会有什么影响,再来分析如何合理地进行产前饲喂量的控制。

产前吃多有弊端

分娩是一个强烈的应激,母猪产前吃得太饱,产后暂时性的胃肠道功能紊乱会导致饲料在母猪胃肠道中停留时间过长,最终导致便秘的发生;便秘发生后会导致母猪发生低烧、食欲不佳;母猪产后如果食欲不能在3~5天内迅速恢复到高水平,则势必影响母乳分泌;如果母猪吃得太多,产后泌乳过多,小猪吃不完会导致乳房炎的发生,过于黏稠,仔猪吃了不消化,影响仔猪的健康。

产前饥饿也不好

母猪产仔是个费力的活儿,产前吃不饱,会让母猪在产仔过程中出现体力不足,使产程增长,增加难产的几率,且影响母猪产后体况的恢复,也会影响出生小猪的活力;产前母猪要是太饿,营养跟不上,胎儿营养供给不足,会影响出生小猪的质量;产前吃得太少,处于饥饿状态,会使母猪的泌乳功能下降,分泌初乳的量和质量都会下降。

减料加料分情况

根据母猪体况和乳房发育决定母猪产仔前几天的饲养。

体况好和乳房发育好的母猪: 产前3~5天逐渐减少饲喂量至妊娠后期水平的1/2或1/3,以防乳汁分泌过多引起乳房炎,或乳汁过浓引起仔猪下痢。

较瘦母猪: 不应减料。

产前几天乳房膨胀不够的母猪: 应加喂一些富含蛋白质的催乳料,如添加鱼粉。

根据胎次: 头胎和二胎的母猪产前控料,原因是头胎和二胎的母猪,本身体型小,采食量低,看起来喂料不多,也饱了;相比之下3胎以后的母猪,体型大,光养着那么个大身体就需要消耗很多的料,所以几乎永远吃不饱,始终都处于控料当中。

猪猪网友

一名养猪大户的心声： 每头盈利近千元 这钱赚着不踏实

据《21世纪经济》报道“玉米价格大幅下降,猪价涨得又快,现在出栏一头猪盈利接近千元,但这钱赚着不踏实啊!”在全国生猪调出大县山东省齐河县,1991年开始养猪的齐河泽佳牧业负责人朱英强一见到记者,就一股脑地道出自己的心声。

来自山东省畜牧局的统计数据显示,今年第14周(4月4日至10日),山东生猪价格为19.55元/公斤,同比上涨59.46%,创2008年以来的新高。那么,当前出栏一头猪能有多少盈利?

朱英强先给记者详细算了一笔成本账: 母猪生产一头仔猪花费180元;仔猪哺乳期吃奶,到体重6.5公斤时断奶期间喂母猪饲料产奶需130元;按料肉比2.8:1(喂2.8公斤饲料长1公斤肉)、当前饲料2.2元/公斤计算,再长103.5公斤(总重约110公斤出栏)需饲料钱637.56元;每头猪还需平摊贷款利息、土地租金约30元,防疫费约50元,人工、水电费约40元。当前出栏一头110公斤的生猪,总成本为1067.56元。

“按照眼下19元/公斤的生猪出栏价,我

的养猪场一头猪盈利能突破千元,即使算上夭折的小猪成本,一头猪也能盈利900多元。”话语中,朱英强难掩喜悦。

据朱英强分析,此轮生猪盈利高峰的出现有两大原因。一是多数养猪户前几年亏损严重,大量淘汰母猪压缩产能,导致当前生猪供应量不足,猪价大涨,进一步抬高了盈利空间;二是去年秋收后至今,占饲料比例六七成的玉米,价格从前几年2.7元/公斤降到1.6元/公斤,带动养殖成本明显降低。

巨大的盈利空间让这位大半辈子都在养猪的大户忧心忡忡。“这意味着一轮超强‘猪周期’或许已经在路上了。”朱英强意味深长地说。而他口中的“猪周期”,指的是近年来我国猪肉价格周期性大幅波动的现象,即养猪业陷入“供不应求肉价上涨——补栏母猪——生猪供应增加——供大于求肉价下跌——淘汰母猪——生猪供应减少——供不应求肉价上涨”的循环。

朱英强告诉记者,2014年到2015年上半年猪价持续低迷,最低时每公斤生猪跌破10元,当时玉米价格还处于高位,育肥一头猪亏

损四五百元,“迫不得已之下,我卖掉了大多数仔猪以减少育肥猪,这才保住家底,不然至少要亏损100多万元。”他说。

面对此轮生猪价格快速上涨,朱英强发现,之前压缩产能或清栏退出的部分散养户已经“按捺不住”,四处收购仔猪和母猪。散户们重新入市,让今后两年出现一轮价格低谷期的可能性在增大。

朱英强说,现在养殖技术、管理水平较好的养猪场,也只是“赚1年、平1年、亏1年”,亏损一旦加剧或者时间延长,很容易被市场淘汰。“这轮价格上涨幅度这么大,我心里很不踏实。”他感慨道,价格波动本是正常现象,但猪价从“亏损四五百”到“盈利近千”的起落幅度还是有些大。

在生猪价格起起伏伏的这些年,多次“躲过一劫”的朱英强坚信,真正的养猪户不会盲目淘汰母猪,更不会盲目补栏,理性应对市场的起伏起伏,才能经得住养猪业转型升级的“大浪淘沙”。

(新华网)

产蛋鸡春季饲养管理要点

春季气候由冷变暖,气温逐渐回升,日照逐渐延长,是鸡产蛋最旺盛的季节。这时要特别注意加强管理,最大限度地满足蛋鸡对营养和环境条件的需要。但此时由于气温渐暖,易使管理上放松,也会给鸡群带来或多或少的影

合理调整日粮的营养水平

(1)初春伊始,乍暖还寒,饲料中还应适当增加玉米等能量饲料的比例,以增强鸡体抗寒能力。

(2)供足蛋白质。预产期与产蛋高峰期的鸡需要大量营养物质来满足其产蛋与增重的需要,所以此阶段应适当提高日粮的营养水平,否则难以满足鸡的营养需要。日粮中的蛋白质比例要符合产蛋标准的要求,适当增喂些鱼粉、豆饼等含蛋白较高的饲料。粗蛋白含量不得低于16.5%。一般鸡的产蛋率每提高10%,日粮中的粗蛋白质要提高10%左右,当预见产蛋率上升时,要提前一周喂高蛋白饲料,当产蛋率下降时,不要急于调低蛋白质水平,要维持一周再调低,以减慢产蛋率下降的速度。如果此时产的蛋做种蛋用,应注意饲料营养全面,适当添加VA、VC、VB等维

生素。为了避免产软壳蛋或母鸡患软骨病,在产蛋量最多的时候,应将蛎粉增加到7%~8%,也可另设料槽补饲蛎粉或蛋壳粉。

(3)合理控制能量。此季节日粮中能量应达到每千克2.75兆卡~2.85兆卡,日粮中含能量较高时鸡采食量低,蛋白质摄入量就不足,既造成能量浪费,又影响鸡对蛋白质的摄

搞好鸡舍的环境,加强防疫

(1)入春以后,应对鸡舍内外和整个鸡场内外彻底地清扫一次,以减少疾病的威胁。

(2)初春时节,昼夜温差大,在管理上,要注意鸡舍保温,尽量使产蛋鸡舍气温维持在10℃以上,同时也要兼顾通风换气。在每天中午气温高时打开门窗,以排出有害气体,应根据情况逐渐地将防寒设施撤去,但要注意避免鸡群受寒。育成及产蛋鸡的日温差应控制在6℃之内,避免因温度的不稳定给生产造成损失。初春气温低时,早上放鸡出去前,必须先开窗户,调节室温30分钟以后再放鸡,注意不要突然把鸡放出户外,因为这样鸡易感冒。

(3)注意光照时间。产蛋鸡应每天早5点



(5:30或6:00)开灯,晚9点(9:30或10:00)关灯,使光照时间稳定在16个小时。若用红灯光照效果更佳。

(4)春季中期后,气温稳步提高,鸡的生理机能更加旺盛,产蛋率也迅速提高。但此时也是微生物大量繁殖的季节,蚊蝇等昆虫也开始滋生繁殖,而多风多雨的气候特点又利于疾病的传播,搞好环境卫生和加强防疫应列为日常管理工作的重点。

此外,从鸡群中将病、弱、残等不产蛋鸡挑出淘汰,加强疾病预防工作,勤除粪、勤消毒。产蛋窝要勤换垫草、勤扫粪便,增加捡蛋次数。有条件的鸡场要搞新城疫、传染性支气管炎等疫病的抗体监测,发现异常立即免疫,也可以进行预防性投药。

黑依欣

【生猪行情】

肉猪价格(元/公斤)

闵行区:21.0
嘉定区:20.6
浦东新区:20.0—20.4
奉贤区:20.0—20.4
金山区:20.8
崇明县:20.5
(本期是2016年4月15日所采的价格。)

沪郊毗邻地区苗猪交易价(元/公斤)

嘉定区:46.0
浦东新区:40.0—42.0
奉贤区:47.0
(本栏目信息由上海市生猪行业协会提供)

本版由上海市生猪业行业协会协办

【实用技术】

奶牛春季催乳有哪些好方法？

奶牛春季催乳常用的方法有五种：

保持适宜舍温

奶牛产奶所需的临界温度是22℃,除用暖棚养牛外,早春要达到这个温度很困难,但最起码应使舍温保持在13℃。

确保营养全面

春季在给奶牛喂足干草或青贮饲料的基础上,还要适当提高奶牛日粮的营养水平。参考饲料配方:玉米面60%、豆饼20%、麸皮10%、脂肪3%、食盐1.5%、骨粉2%、小苏打1.5%和促奶预混料2%。如果没有青饲料,每天应喂给奶牛切碎的胡萝卜、马铃薯或新鲜大白菜叶等5~7公斤。在奶牛正常产奶的基础上,每多产4公斤奶,应给奶牛增喂1.5~2公斤混合精料。

供给足量温水

春季如果给奶牛饲饮冷水,会使奶牛消耗大量的体热,降低产奶量;饮水不足会导致奶牛发生某些疾病。因此,应注意春季供给奶牛足量的18℃左右的温水。

保持圈舍卫生

奶牛舍干燥有利于保温,所以,牛舍必须多垫、勤垫干草,及时清除粪便,并经常在舍内撒些石灰粉或草木灰等。这样既可以降低奶牛舍内湿度,又可以消毒防病。

坚持日晒运动

在晴好天气,每天至少要让奶牛运动两小时,然后将其牵至背风朝阳的地方晒晒太阳,加强奶牛的血液循环,杀灭奶牛体寄生的细菌,帮助和促进奶牛消化,提高奶牛的体质和产奶量。

曹平

春季接羔注意事项

产前的准备。

母羊产羔前须备好产房,保持温度在5℃以上,并用2%~4%的来苏水或15%~20%草木灰水消毒。地面铺上干草或沙土以保持干燥。同时还要适当地准备些消毒药品(如酒精、碘酊等)和其他工具。

接羔。羔羊出生后人工掏出嘴、鼻、耳中的黏液,让母羊舔干羔羊身上的黏液。有些初产母羊恋羔性差,可将胎儿黏液涂在母羊嘴上或撒麦麸在羔羊身上让母羊舔食。产后羔羊脐带会自然扯断,有的脐带不断,可用手拧断,然后消毒;若用剪刀,应先掐住脐带根部,把脐带中的血液向外排挤,扭转脐带,涂上碘酒,再用消毒剪刀在距羔羊腹部4厘米处剪断。

产后母羊应供给温水,最好加进少量麸皮和食盐。分娩结束,用剪刀剪去母羊乳房周围的长毛,然后用温热消毒水清洗乳房,擦干,挤出最初的几滴乳汁,帮助羔羊及早吃到初乳。

冻僵羔羊的急救。对冻僵的羔羊,应立即转移到暖房内,放到38℃水中并使水温逐渐升高到40℃(露出头),经过20~30分钟的温水浴后,再进行人工呼吸,一般可救活。

认真做好个人防护工作。接羔时要加强羊舍内外的消毒工作,及时清理羊舍内的垫草和其他杂物,并认真做好个人的防护工作,进出羊舍和接羔时按照有关规定采取带塑胶手套、口罩等防护措施,以免感染布病等人畜共患病。

干依