

鹅寄生虫病的防治措施

鹅剑带绦虫病。该病由矛形剑带绦虫等多种绦虫所致的鹅肠道寄生虫病，鹅群放牧下水容易被感染发病。该病主要危害数周至5月龄鹅，因此必须有计划用药物驱虫。患病鹅表现为消瘦、精神萎靡、离群静坐、翅膀下垂、脚软、走路摇晃、甩头、运动失调，两脚作划水动作，麻痹由两脚开始，发展到全身，向后坐或倒向一侧而死亡，排出灰白色稀粪中常见乳白色绦虫节片。

防治：商品鹅群应在1~1.5月龄时驱虫1次。留种种鹅群除了1~1.5月龄时驱虫1次外，在4~5月龄时应再驱虫1次。吡喹酮，每公斤体重用药30~40毫克，1次拌料投喂；灭绦灵片，每公斤体重用药50~60毫克，1次拌料投喂；丙硫咪唑，每公斤体重用药10~25毫克，1次拌料投喂；硫双二氯酚，每公斤体重150~200毫克，1次喂服；氯硝柳胺，每公斤体重50~60毫克，1次喂服。

鹅球虫病。寄生于鹅的球虫有16种，最常见的为肠球虫。各种年龄鹅都可能感染，幼鹅发病率和死亡率较高。症状为摇头，口流白沫，伏地，颈下垂，排水水样粪便。青年鹅、成年鹅常为带虫者，而雏鹅和仔鹅对球虫易感，因此必须分开饲养防止被感染。5~8月份为球虫多发季节，有该病流行区域或鹅群需在饲料中添加药物预防。

防治：做好养殖场严格消毒工作，该病主要危害3周龄至3月龄鹅，预防应集中于20~90日龄，一旦发生该病，应立即用磺胺药、氯苯胍、氯丙琳、青霉素等防治。每公斤体重用250毫克氯丙林拌料，连喂3天；每公斤体重用氯苯胍10毫克拌料，连喂3天；每公斤体重用球虫宁30毫克拌料，连喂3天。

鹅裂口线虫病。该病对雏鹅和仔鹅危害大，与青、成年鹅分开饲养，不到低洼潮湿地带或死水塘放牧，可大大减少发病。

防治：放牧的鹅群应定期驱虫，商品鹅进行1~2次，留种种鹅群须进行2~3次。病鹅应隔离治疗，可用左咪唑或丙硫咪唑，每公斤体重25毫克，1次口服；甲苯咪唑，每公斤体重用30毫克，1次口服。

欣欣往

[生猪行情]

肉猪价格(元/公斤)

闵行区:21.6
嘉定区:21.4
浦东新区:20.6~21.8
奉贤区:21~21.4
金山区:21.6
(本期是2016年6月3日所采的价格。)

沪郊毗邻地区苗猪交易价(元/公斤)

嘉定区:50
奉贤区:48.0
(本栏目信息由上海市生猪行业协会提供)

本版由上海市生猪业行业协会协办

打造“健康猪肉”需关注的几个问题

随着消费者食品安全意识的加强,关于健康猪肉的话题一直不断。一般来说,健康猪肉的生产要求养猪场的用药符合兽药使用标准,养猪从业者和上下游企业须严格按照相关政策法律法规的规定,坚持做到规范用药、科学用药,坚持绿色健康养猪理念,确保肉食品产品的安全。

可添加“药添字”的饲料用药

商品猪饲料配方中可根据《饲料药物添加剂使用规范》,合理使用饲料药物添加剂。注明“药添字”的饲料用药,具有预防动物疾病、促进动物生长作用,可在饲料中长时间添加使用。用于生猪饲料的主要有两类:一类是具有明显的促生长作用,如:莫能菌素钠预混剂、杆菌肽锌预混剂等10种;一类是兼具抑菌和促生长,如:盐霉素钠预混剂、硫酸黏杆菌素预混剂等7种。

严禁添加“兽药字”的饲料用药

《饲料药物添加剂使用规范》中注明“兽药字”的饲料用药,用于防治动物疾病,并规定疗程,仅是通过混饲给药的饲料药物添加剂,不能直接用于商品猪饲料中,畜禽养殖场及养殖户须凭兽医处方购买、使用。

“兽药字”饲料用药大致分为两大类:一类具有驱虫作用,包括伊维菌素预混剂、环丙氨嗪预混剂等7种;一类具有抑菌作用,共16种,其中用于畜禽的主要有11种,包括磷酸泰乐菌素预混剂、硫酸安普霉素预混剂、盐酸林可霉素预混剂、赛地卡霉素预混剂、硫酸新霉

[养殖园地]

鸡舍管理小妙招

降低循环水温

当外界气温达35℃时,上午11:00和下午15:00在循环水池中投冰,虽然冰块一小时后即溶化,但在日温差小的炎热天气,中间能形成1~2次较低温度,这对减少鸡的热应激有较大的好处。

一次性投冰在地上或盆内

为防止热气流直接入舍,要求将鸡舍门关严,这样势必在舍内形成几个低风速、高温区,为缓解高温小区对鸡群的热应激,上午11:00一次性投冰在地上或盆内让冰缓慢蒸发溶化,形成局部降温区。

开启水泵使用湿帘

间歇使用湿帘,不能等到鸡舍温度升上来后,再开启水泵,而应当舍温缓慢上升时就应使用,一般在早7:00左右和晚22:00左右使用湿帘。但长时间使用湿帘,易使鸡舍湿

素预混剂、磷酸替米考星预混剂、磺胺氯吡嗪钠可溶性粉等。

科学使用兽药注意“休药期”

兽药是用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节其生理机能的物质(含药物饲料添加剂),包括兽用处方药和兽用非处方药。兽用处方药需按照兽用处方药遴选原则和兽用处方药目录科学选择和使用。食品动物从停止给药到许可屠宰或其产品(肉、乳、蛋)许可上市的间隔时间为休药期。为保证动物性产品质量安全,须严格按照兽药国家标准和专业标准中部分品种的停药期规定加强兽药使用管理。如,氟苯尼考粉的休药期:猪20日,鸡5日;延胡索酸泰妙菌素预混剂的休药期:猪7日;硫酸黏杆菌素(可利肥)休药期:7天,蛋鸡产蛋期禁用。

严禁使用各种“禁用药”

根据《无公害食品畜禽饲养兽药使用准则》中所列“食品动物禁用的兽药及其他化合物清单”,其中包括四大类:第一大类是禁止用于所有食品动物所有用途,如β-兴奋剂类、性激素类,具有雌激素样作用的物质,氯霉素及其盐、酯(包括:琥珀氯霉素)及制剂,氨苯砒及制剂,硝基呋喃类,硝基化合物,催眠、镇静类,包括安眠酮及制剂等八类。第二大类是禁止用于动物杀虫剂用途,主要是各种杀制剂和性激素类。第三大类是禁止用于水生食品动物杀虫剂、清塘剂、抗菌、杀螺剂用途,主要有九种禁用药。第四大类是禁止用于所

度趋于饱和,造成鸡散热困难。因此,应间断使用,可采取启用1小时、停1刻钟即可。

防止鸡的热应激

饮水中投冰,加防暑药品,在鸡舍饮水箱中投冰,可有效地降低鸡的饮水温度2℃~5℃。在制冰时加入少量柠檬酸,能减缓鸡的热应激。通过在水箱中加小苏打粉、十滴水、薄荷汁、金银花汁等药品的观察,对防止鸡的热应激,是切实可行的。

勤除粪降低舍内湿度

勤除粪,降低舍内湿度,保持空气新鲜,每日增加一次清粪,可减少鸡舍内氨气、硫化氢等。适时开门,加大通风量,形成过堂风降低有害气体浓度,保持舍内空气新鲜,并可带走一定的水分,减少舍内相对湿度,提高湿帘降温的效果。

保证最大的进风面积

[实用技术]

夏季猪场防暑要有针对性

苏打1%~1.5%、食盐0.3%。

临产母猪。夏天产房应选通风良好、并有遮阳设施。母猪临产前2~3天减少精料,多喂青料,精料中麸皮比例要提高,以清肠防便秘为目的,产完仔猪后喂麸皮温盐水一次。

商品大猪。高温季节难养,常出现倒槽不吃食,影响生长。一般在高温季节未到之前将肥猪出售,如果不出售,应降低饲养密度,每圈少养几头,每头猪占圈面积1~1.2平方米。喷水降温,早晚喂料,中午加喂青料或稀料,料中加小苏打1.5%、食盐0.3%。

哺乳仔猪及小猪。喜卧阴湿地面,注意天气变化以防着凉拉白痢或拉稀。保持圈面干燥,供清洁饮水,常消毒。预防可用每公斤料加120毫克土霉素喂几天停几天,治疗时每公斤料加土霉素200毫克。

申昕光

羊焦虫病应该如何防治

羊焦虫病是一种血液寄生虫病,主要发生在3~10月份,发病高峰期在4~5月份,是由吸血蜱在吸血过程中引发,羔羊、幼羊易感染,而2岁以上的成年羊则很少发病。

临床表现:持续高热(40℃~42℃),呼吸困难,后期出现眼结膜苍白、贫血,消瘦,便秘或下痢,喜卧地,站立不稳,行走困难,有的出现血红蛋白尿,常因心肌衰竭而死亡。病程6~15天,急性常在发病2~3天内死亡。

治疗:(1)三氮脒(贝尼尔,血虫净),用量为5~7mg/kg,稀释成5%的水溶液深部肌肉分点注射,连用2~3天。(2)对症治疗,对病羊加强护理,减少外出放牧,补充精料;对高热患羊,可用解热药如安乃近、安痛定治疗;(3)抗生素治疗:该病

有食品动物促生长用途,主要有三类药物,包括酮、苯丙酸诺龙、苯甲酸雌二醇、及其盐、酯及制剂,催眠、镇静类,硝基咪唑类等。在生猪等食品动物的养殖中,须严格按照规定,杜绝“禁用药”的使用。

切忌直接使用“原粉药”

兽药原粉是兽药厂制造成品兽药的原料,属于兽药原料药,农业部最新发布的《兽药产品批准文号管理办法》规定,兽用原粉出厂前需申报批准文号并标注“兽药原字”。

成品兽药由原料药和增效剂、助溶剂、稳定剂等多种成分构成,在实际动物养殖中只有使用成品药物才能发挥出最好的药效。禁止将兽用原料药直接添加到猪饲料及饮水水中或直接喂喂生猪,必须制成预混剂后方可加入猪饲料中使用。

“少用药”是关键

健康养猪的关键在于生猪的饲养管理,减少不必要的抗生素等兽药的使用,核心在于提高猪饲料的营养水平、加强猪群的饲养管理,提高生物安全意识,合理使用疫苗作好猪场重点疾病的疫苗免疫接种,建立合理、完善的药物预防方案。树立健康养猪理念,合理选用微生态制剂保障猪体健康。如丁酸梭菌、地衣芽孢杆菌等微生态制剂的使用在于增加猪体有益菌群,竞争性抑制病原微生物,降低猪肠道疾病发病率,进而减少兽药等抗生素的使用,增强猪体抵抗力,改善猪肉品质。

一天

保证最大的进风面积,为了不破坏密闭鸡舍的特性和通过湿帘纸的空气在进入前有一个初步的降温过程,那就必须将湿帘房的百叶窗开到最大位置,加大进风口面积的结果,会使更多的空气通过湿帘。湿帘用了一周后,其上粘附着较多的灰尘,堵塞了进风小孔。因此。需定期用毛刷轻轻刷掉上面的灰尘,保证有效的进风量。

白天减少短路气流,夜间加大通风量

白天尽量减少短路气流,夜间应加大通风量,根据湿帘通风降温的原理,全部进风必须通过湿润的湿帘。在白天不要打开门或送风的百叶窗,以防过热的空气流入鸡舍,影响降温效果。然而,到夜间,因昼夜温差关系,鸡舍内温度一般比舍外稍低或稍高,在这种情况下,就应开门,加大通风量,形成过堂风的快速气流。

调整饲料浓度

夏季鸡群的采食量减少,应根据鸡的采食量对饲料的能量、蛋白质等营养成分进行调整提高。

张亮