

三农实用周刊
面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

【蔬菜病虫害诊断与防治】

甜瓜细菌性斑点病

(接上期)

绿色防治用药: 可选20%噻菌铜悬浮剂(龙克菌)500~700倍液(666.6平方米用量80~100克)(可兼治霜霉病); 77%氢氧化铜可湿性粉剂(可杀得、丰护胺)600~800倍液(666.6平方米用量75~100克)(可兼治霜霉病); 6%春雷霉素可湿性粉剂150~300倍液(666.6平方米用量200~400克); 72%农用硫酸链霉素可溶性粉剂4000倍液(666.6平方米用量15克)等喷雾。

常规防治用药: 47%春雷·王铜可湿性粉剂(加瑞农)600~800倍液(666.6平方米用量75~100克)(可兼治霜霉病); 72.2%霜霉威盐酸盐水剂(霜危、普力克)600~800倍液(666.6平方米用量75~100克)(可兼治霜霉病); 30%DT可湿性粉剂600倍液(666.6平方米用量165克)等喷雾。

上海奉贤拍卖行
拍卖公告

受有关部门委托,我行定于2016年10月21日公开拍卖冷冻专用设备一批。现将有关公告如下:

一. 拍卖标的:
冷冻专用设备一批(详见评估清单)。

二. 咨询、看样、登记时间、地点:

1. 咨询、登记时间:
2016年10月19日—10月20日
上午:9:00—11:00 下午:13:30—15:00

2. 咨询登记地点:上海市奉贤区南桥镇解放中路249号

3. 联系电话:
57185234

4. 联系人:盛先生

三. 拍卖时间、地点:
1. 拍卖时间:2016年10月21日(星期五)上午10:00

2. 拍卖地点:上海市奉贤区南桥镇解放中路249号

注:
1. 竞买人持身份证和《企业法人营业执照》登记及法人身份证登记。

2. 竞买人委托代理人参加竞买的,代理人必须出示合法有效的委托书。

拍卖保证金:200000元,必须在拍卖会(2016年10月20日15:00时)前解缴至本公司账户后方能办理拍卖登记手续。

上海奉贤拍卖行
2016年10月13日

沪郊十月蔬菜农事要点

加强秋菜田间管理,抓紧做好冬菜的育苗和越冬蔬菜的定植和播种

10月处于寒露和霜降两个节气,月平均温度为18.4℃,常年月降雨量70毫米左右。本月天气渐凉,降雨量一般偏少,往往会出现持续的秋旱。

月底有出现初霜的可能。本月蔬菜农事以加强秋菜的田间管理为主,并要抓紧做好冬菜的育苗工作和越冬蔬菜的定植和播种。

播种育苗及定植

1、春卷心菜(“尖头”品种)、早春莴笋上旬开始播种;

2、“四月慢”青菜中旬开始播种、菜薹(耐寒力较强的品种)中旬前后开始播种育苗。

3、大棚茄子中旬开始、大棚番茄和辣椒下旬开始播种育苗。

4、雪菜等上旬结束播种育苗。

5、青菜和芹菜继续定植;塌菜上旬开始定植;

6、菠菜、香菜继续播种;芥菜在上旬播种;蚕豆、碗豆月内播种。

7、采用机械化直播的,要根据不同品种调整好用种量及密度,整细整平畦面。

田间管理

1、加强秋菜的田间管理:

本月气候适宜,各种蔬菜生长迅速,因此,要以追施重肥和及时浇灌来满足快速生长所需要的养分和水分。但在施肥和浇灌方法上,要根据当时天气和不同蔬菜而有所不同,特别在抗旱方法上,采取喷、浇或浅水沟灌,即使是旱象持续期长,宁可增加抗旱次数,也不宜大水漫灌。但如果出现连续阴雨天气,要做到雨后及时排水。合理使用叶面肥。

2、继续加强软腐病、霜霉病、病毒病以及菜青虫、蚜虫、小菜蛾等病虫害的防治工作。

3、做好松土、除草、壅土等工作,特别是越冬的花菜和卷心菜要加强壅土护根,以防冻害。注意大葱的及时培土。

4、秋番茄、秋辣椒在早霜来临前用塑料薄



膜覆盖,以免遭受霜冻。

5、对秋刀豆、茭白等蔬菜要注意及时采摘,否则会影响质量。

6、继续做好茄果类蔬菜的育苗工作。如苗床的整理,培养土的配制等。塑料大棚提前做好。

7、月底前后利用零碎地栽植青菜、塌菜等蔬菜,以增加来年一、二月份淡季的供应。

8、蔬菜标准园及创建单位要继续按照有关要求做好各项工作。 依技



大棚辣椒秋后再生技术

适时适量剪枝结果盛期结束后,要剪去三杈以上的分枝及弱枝、病枝,但要注意不能过量,以免降低坐果率。修剪时间宜选择在晴天上午8~9时,以保证伤口在当天愈合,避免病菌侵染。

加强管理剪枝后的半个月内是新枝、新叶和花蕾生长发育的关键时期,应搞好肥水管理,一般每亩施腐熟的人粪尿3000~4000公斤、复合肥12~13公斤或用尿素10公斤。施肥后遇干旱天气应及时浇水并培土护根,

修剪后一周内喷施植物健身素一次,以促进新枝迅速生长。修剪后,由于肥料充足,新枝又生出很多,要适时进行再修剪。

及时覆膜保温再生椒在9月中旬左右开始坐果,10月进入盛果期。随着气温的下降,除及时采收上市外,在下霜前应盖上塑料棚增温。从11月上旬开始,大棚内要增设小拱棚防寒保温。如果在春节前采收红椒,则应从11月中旬起在夜间加盖草帘保温,有条件的可叶面喷施防冻剂。 依技

大葱施肥要点

大葱比较喜肥,与其他蔬菜一样,对氮素的反应很敏感,施用氮肥有明显的增产效果。

大葱生长盛期吸收氮的量要高于钾(1:0.9),而进入叶鞘充实期,对钾的吸收量要比氮高(1:1.2)。每生产3000公斤大葱,需吸收氮8~10公斤、磷1.5~1.8公斤、钾9~11公斤。大葱对磷的要求以幼苗期最敏感,苗期缺磷时会严重影响大葱的最终产量,如果苗期磷供应充足,即使定植后磷素不足,在后期采取追肥措施,仍可取得较高的产量。在大葱白形成期应加强钾肥的施用。除氮、磷、钾外,钙、镁、硼和锰,对大葱的生长也有一定的影响。在三要素满足供应的情况下,增施钙、镁和硼和效果最为显著,表现为葱

白长而粗,产量高。具体施肥方法如下:

定植地选择好后要施足基肥,施肥方法视肥料用量而定。数量多时可全面撒施,少时宜施在定植沟底层,以腐熟的有机肥为主。一般每亩施优质腐熟厩肥5000~8000公斤。含磷少的土壤每亩施过磷酸钙25公斤、草木灰150公斤或硫酸钾8~10公斤。

定植后葱苗生长缓慢,随天气逐渐转凉,葱株进入旺盛生长期。当大葱进入葱白生长盛期,葱株迅速长高,葱白加粗时要进行追肥。第一次追肥,每亩施土杂肥4000公斤于垄背上,或施用饼肥150公斤,施后随即浅锄1次,并浇水1次。过15天左右追第二次肥,浇施人粪尿750公斤或撒施草木灰100公斤、过磷酸钙30公斤,施肥后结合深



锄,进行培土,随即浇水。再过25~30天进行第三次追肥,每亩追施氮素化肥15~25公斤,追肥后浇水、培土,此时葱白迅速增重而充实,直至收获。如果土壤肥力较高,底肥充足,可不进行第一次追肥。生长期较短和土壤肥力好的地区,可免去第三次追肥。 依柯



荷花越冬如何管理

肥料盆(缸)栽培荷花,若以富含腐殖质的塘泥等做栽培基质,一般不需要增施底肥就能满足植株的需要;若以贫瘠的泥土做基质,则需要增施底肥,用腐熟饼肥、骨粉等按一定比例与泥混拌即可。盆(缸)栽培荷花喜肥却忌重肥,特别要防止基肥过量。如果盆(缸)内水发黄,有气泡冒出,多为施肥过量所引起,应及早小心挖出种藕,更换泥土重新栽植。在花蕾出水前后,如果叶片出现退绿泛黄现象,每盆(缸)可以均匀施入3~4克优质复合肥;如果长势旺盛,叶色浓绿,手感硬实但花蕾迟少,可以单独施磷、钾肥,并施适量硼、锌肥。

水分盆(缸)栽培荷花,应在种藕栽好后隔1天浇2~3厘米深的水,在线叶长出时,水深可增至5厘米,同时要保护好新生的小叶,随时捞出水苔和藻类,提高土温,利于立叶尽快挺出水面。随着立叶抽出,气温上升,逐渐将盆(缸)内水加满。当立叶长出2~3片时,通常将残老的浮叶摘去,保持盆面通风透光。

病害防治应以预防为主,如选用抗病品种,合理轮作,增施有机肥,清理枯枝病叶等,是减少病虫害的有效手段。多施腐熟有机肥,增施磷、钾、硅肥,控制氮肥施用量。实行水旱轮作,减少病原积累。 依柯