



源自大自然的馈赠

享受生活 选择丰美

绿丰果园 上海丰美果蔬专业合作社

地址：崇明县横沙乡育贤南路1068号 电话：021-56899531 手机：15026998996 联系人：陈先生 网址：www.fengmeish.com

经营范围：
“真”开心土地领养；林地鸡鸭鹅；特色农家乐；
各类绿色有机蔬菜、大米；田园风光游等等

坚持打造绿色原生态种植环境



“真”开心农田
诚邀你的加入



东方城乡报

三农**实用**周刊

面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

【热线答疑】

如何种植佛手瓜？

佛手瓜是葫芦科攀缘性宿根植物。性喜温暖，但不耐高温，也不耐严寒，属短日照植物，在长日照下不能开花结果。日平均温度12℃以上时开始萌芽生长，适宜生长温度在18~25℃之间，可采用多年宿根栽培。

结合整地重施基肥

每穴施腐熟优质农家肥50~100千克，佛手瓜作为多年生的植物，南方栽种的行距应该宽些，一般株行距5米×5.5米开穴，北方栽种的间距可适当减小。

适时定植

种瓜内只有1粒种子，一般都以整个瓜进行育种。育苗：可在春季3~4月，待3~4张真叶时于秋季定植。块根分植：清明左右，将老株兜头挖开，用刀切下重50克左右并带2~3个芽的块根，栽于穴内，盖土后使芽露出1~1.5厘米，再盖草保温保湿，有利于快速生长。

施肥浇水

佛手瓜定植后不需马上追肥，一般在初花期施肥一次，盛花果期可第2次施肥，肥料以速效性化肥结合腐熟的有机肥挖浅环沟施入。再过20天左右，植株生长茂盛并大量开花结果时，要及时补充养分，离主根20厘米外每株施优质农家肥80~120千克，浇透水，使穴土保持湿润；生长期宜勤浇水，保持土壤湿度，结合追肥使植株处于生长期为好。

搭好棚架

当苗高0.5~1米时搭倾斜式架引蔓上棚，棚架高度以人手可操作为好。

植株调整

植株除主茎外可保留2~3枝健壮侧蔓上棚，并摘除多余侧枝。上棚后进行1~2次摘心，以促进分枝，增加结瓜数，使瓜蔓在棚架上呈放射状分布。植株进入旺盛生长时，形成相互遮荫，若出现叶蔓重叠、枯萎和落花落果现象，可摘除大部分雄花及过密枝叶，减少养分消耗，增加通透性，保持植株健壮繁茂。

防治病虫害

佛手瓜地上部无病虫害，不需喷药；而地下部虫害主要为金龟子的幼虫(蛴螬)，可用500倍的50%辛硫磷浇杀。

适时收获

佛手瓜以嫩瓜供市，从开花到成熟20天左右，一般结果后10~15天即可采摘。

冬季保温

冬季地上部枯死，地下根可用稻草或其他透气覆盖物进行保温，翌春萌芽前揭去。

盆栽草莓既能品尝新鲜果实，又能观赏并美化环境，其栽培管理要点如下：

品种

目前上海郊区草莓品种主要有日本品种如“红颜”、“章姬”、“丰香”；欧美品种如“甜查理”、“卡姆罗莎”；此外还有引进培育的“新屯一号”等。日本品种果实长圆锥形，呈鲜红色，果肉多汁、甜香且个头较大，品质较高，近年发展势头较快。欧美品种果形为圆锥形，表面深红色或暗红色，味甜，个头较小些，生长势较强，产量较高。“新屯一号”主要特点是适合大棚栽培，结果期长，丰产性强，果实粗圆锥形，果面鲜红色，风味甜香。盆栽草莓最好选择果大，生长势强的品种。

容器

可用花盆或木箱。花盆用20~33厘米×20~33厘米的泥瓦钵，木箱大小根据植株数量决定，箱底要有渗水孔，栽植前应将花盆或木箱放入水中浸湿。

培养土

最好用阔叶林表层的腐殖土或售卖的草炭土+蛭石或珍珠

岩+有机肥配制的基质。也可用田园土、腐熟的厩肥、河沙(河沙需淋洗)各1份均匀混合，再加入2%~3%的过磷酸钙。还可利用肥沃的菜园土加少量腐熟的有机肥。此外，在花盆底部也可放些碎骨、鱼粉或蛋壳等有机物。培养土应腐熟半个月后再装盆。

种植方法

一个花盆可栽1~3株，也可将不同成熟期的品种选栽到一起，利于授粉，并能延长观赏和食用期。盆栽分春栽和秋栽两种。栽植时要选用当年的匍匐茎新苗，具3~5片叶，叶柄短粗，顶芽饱满，白色须根多的健壮苗。先在盆内装一部分培养土，把苗根向四周舒展开后填土。盆土不要填得太满，上面留出3厘米距离。栽植时要将老叶及匍匐茎和发黑须根剪去，将植株根摆直，茎的龟背处朝外。栽后将土压实，并立即浇透水，也可将盆浸于水槽中渗透水。为防止植株下沉埋没顶芽，可适当将草莓苗轻轻一提，再压土，做到“深不埋心，浅不露根”。

肥水管理



盆栽草莓每7~10天追肥1次。在室外，盆栽叶片易缺水萎蔫，要早晚浇小水1次，经常保持盆土湿润。夏天不要直接放在阳光下暴晒，最好放在遮阳大棚内，其他季节都应摆放在阳光充足的地方。

植株管理

需要结果实的应及时摘除抽出的幼嫩匍匐茎，如以观赏为目的，则可把匍匐茎留下，使其长出

丛叶自然下垂，培养成吊兰状。要及时摘除黄叶，及时培土，但不要覆盖苗心。有条件的，春季结果后，于立秋前后换1次盆，新盆要比原盆稍大一些，要加入新培养土，换盆时掰掉黑根老根。冬季来临前，将室外盆栽移入室内有阳光处，或放在朝阳的封闭阳台上。如气温过低，可在盆上罩一层塑料薄膜保温，中午温度高时再拿掉。

丽格海棠冬季如何养护



丽格海棠为葫芦目秋海棠科的草本植物，花型多样，多为重瓣，花色丰富，有红、橙、黄、白、复色等，花朵硕大，色彩艳丽，是大众喜爱的盆栽花卉。它虽然与四季海棠同属一科，但由于产地为热带亚热带地区，喜欢温暖、湿润、半荫环境，加上茎叶肉质、多汁，又是须根系，所以显得比较娇贵，在养护方面就更有一些难度。上海地区，冬季相对温度较低，又相对潮湿，所以冬季养护就更应在以下几方面加以注意：

保温

丽格海棠最适宜的生长温度为18~22℃，一般在15℃以下，

生长就趋于停滞，气温低于5℃就会受到冷害。在上海，冬季低于5℃的天气是家常便饭，所以丽格海棠冬季至少要放在内阳台或朝南房间靠窗处，遇到极低气温还应加个尼龙薄膜罩子保温，如在温室越冬那才是最理想的，放在空调间则应避免直接吹到热风，还需经常叶面喷水，避免叶子干枯。

浇水、施肥

丽格海棠在冬季生长停顿或缓慢，代谢能力差。所以，对肥水的需求较低，特别是浇水方面，不能过湿，否则容易致病，甚至烂根死亡。浇水应视盆土湿度来决定，做到“见干见湿，偏干为主”，由于丽格海棠是短日照花卉，冬季仍能开花，在花期还应施一些肥料，但应以磷钾肥为主，少施氮肥。冬季浇水在中午前后较好。

光照

丽格海棠尽管喜欢半荫，但在冬季，还是需要有一定的光照。如果缺少光照，会影响它的正常开花。

病虫害防治

丽格海棠在冬季受虫害威胁较少，但受病害侵袭的情况相对普遍，其中冬季常见病害有灰霉病、叶斑病、根腐病等，这些病害产生的原因主要是湿度太大，通风不良，以及低温等，应在浇水、通风管理方面多加注意，做好预防工作，一旦出现病害，家庭找农药不方便，可以摘除病叶，喷洒小苏打溶液，加强通风来抑制病害扩展。



猪蹄壳出现了裂缝走路瘸了怎么办

种猪裂蹄症，又称角化不全症。是蹄角质裂开的一种蹄部疾病。常见于高度选育的瘦肉型猪、待配或初配的后备公、母猪，特别是种母猪发病率可达15%~30%，个别养殖场高达70%。

发病原因

此病多发于瘦肉型品种及二元母猪中，四肢纤细的猪最易患此病。生长速度快，瘦肉率高，背膘薄的品种更易得。后备母猪和青年妊娠母猪蹄壳薄嫩，无法承受迅速增加的体重，容易出现裂蹄。

临床症状

以蹄裂、局部疼痛和卧地少

动为主要临床特征。轻则影响猪只进食，严重的会导致猪群步态不稳、肌肉颤抖、前肢爬行、后肢摇晃、无法正常采食、强行驱赶时尖叫和生长速度减慢等基本症状。而公猪群通常会现四肢难以承受自身体重，导致无法配种和性欲下降，部分猪最后容易出现瘫痪。母猪除了会出现以上症状外，还会导致产程延长、产子无力、难产率提高和产后无乳等严重问题。

治疗方法

将发病猪转移到干燥、温暖的圈舍，地面要垫上松软的干草，

在治疗期间要保持地面的干燥和卫生，以防破溃的皮肤被污染。在猪圈的运动场铺垫麻袋，用3%来苏尔溶液或其他消毒液浸湿麻袋，利用猪群在上面的运动，对猪的蹄部进行消毒。

对于已经干裂的蹄壳，每日可涂抹2~3次鱼肝油或红霉素软膏等，既滋润蹄壳，又促进愈合。

对有脓肿及破损，蹄又腐烂并有恶臭味的蹄壳，可用每升0.1高锰酸钾溶液冲洗，然后将高锰酸钾结晶研成粉末涂于患部，适当进行包扎，每日2~3次。

对于钙磷失调的猪蹄病，可

选用维丁胶性钙注射液10~30毫升，肌肉注射，每天一次，连用3~5天。

对于炎症较严重的病例，除进行局部消毒外，还应根据病情选用抗生素对症治疗。

给发病猪只每日饲量中添加1%的脂肪和鱼肝油，配合发病猪只每日喂0.5千克胡萝卜，对预防和尽快治愈有一定辅助作用。

对于卧地不起的病猪，切忌久卧，要定期驱赶，强迫运动，一方面能促进局部的血液循环，又可防止继发肌肉性风湿病。

毛树德