

东方城乡报

三农实用周刊

面向郊区·服务农业·做农民的朋友

[实用技术]

羔羊养殖注意五个点

羔羊是指哺乳期的羊。由出生到断乳的羔羊可分为两个阶段:一是出生后到8周龄阶段,羔羊主要靠母乳生长,关键在于加强母羊的饲料,提高其泌乳能力;二是9周~16周龄阶段,由于母羊泌乳减少,重点应放在羔羊补饲上。

早喂初乳。羔羊出生后30分钟内保证吃到初乳,尽快使羔羊体内产生免疫抗体。

尽早补饲。育羔羊要做到早开食,以刺激消化器官的发育,羔羊出生后10天即可用炒香料、胡萝卜丝、吊鲜草把等训练羔羊早吃草料。

加强运动。羔羊出生后1周后,可在天气晴朗、无风时在运动场中自由活动,增加日光浴。羔羊舍要通风、干燥。羔羊20日龄时就应赶出运动,时间及里程要逐渐延长,从幼龄进行锻炼,育成后体质健康、适应性增强。

细心管理。羔羊的管理一般分两种:一是母子分群,定时哺乳、圈内培育,即白天母子分群,羔羊留在舍内饲养,每天定时哺乳。羔羊在舍内养到1个月左右时要单独放出运动;二是母子不分群在一起养,在羔羊20日龄以后,母子可合群放出运动。圈舍要保持干燥、清洁,勤铺垫草。

适时离乳。羔羊生长到一定阶段,能独立生活即应离乳。正常羔羊一般在3~4月龄时离乳。离乳的方法要逐渐离乳。开始离乳时,每天早上和晚上让羔羊哺乳,以后逐渐增加羔羊的喂饲次数,一般经7天~10天就可以离乳。

(据《农技网》)

河蟹养殖条件有哪些?

河蟹养殖条件有哪些?淡水蟹里面河蟹算是比较受欢迎的品种的,除了其适应性好以外,养殖的收益也是比较可观的。适合养殖的河蟹的地方很多,但是并不是所有地方适合养殖就行了的,还有很多人对养殖河蟹存在一些误区,对河蟹的生长及产量都会造成很大的影响。那河蟹养殖条件有哪些?

合适的位置

一个合适的位置相信难不倒大家,不少地方都能轻松找出来。首先是水源流通方便,日常需要换水的时候不麻烦。其次的话所处的区域要能方便的控制水源大小,尤其是在雨季不能出现积水严重的情况,能及时排水。另外场地要有一定的浅水区域,河蟹也喜欢上岸晒太阳的,这样也方便喂食。还有附近要方便改造,工程量太大的话投资太大划不来。

合格的自然条件

选择一个地方时还要看其自然环境怎么样,毕竟环境也是很关键的一步。基础的自然就是水源的天然纯净无污染了,而且附近还不能有什么容易造成污染的源头。其次水生环境要好,水生环境好的地方一般水草茂盛,鱼虾丰富,这样养殖时河蟹就有充足的天然食物,且也侧面印证这里的水质是十分优质的。水深在1米左右就差不多,池底以石块和沙子的混合物为主,为河蟹打造天然的生存环境。

完善的技术

地方选好了还不行,养殖技术是个关键,毕竟有场地有种苗你不会养也是白搭的。这个极其重要的地方却很容易被人忽视,很多人以为看了一些养殖资料自己就可以养殖了,这是错误的想法,哪有这么简单的事情。有机会的养殖前自己能找一些养殖基



地去学习一段时间,或者可以自己买一些种苗尝试养殖,一边养一边学,不要先想着赚钱。这个门槛大家一定要达标才能去养殖,毕竟养殖河蟹的投资也不少。

病害天敌少

不要以为河蟹身上的壳硬且生活在水里,就以为它没有天敌,大一点的河蟹自然基本没有,但

是幼年的河蟹天敌可不少。主要是河蟹有上岸的习惯,尤其是在其脱壳以后,所以这就给它造就了天敌,常见的有水老鼠、青蛙等等。这些天敌还容易批量聚集来捕食,所以尽量避免在这些东西较多的地方去养殖,毕竟针对这些,养殖户也不是很好预防的。

(据《畜牧招商网》)

鸳鸯鸭养殖的前景和注意事项

养殖鸳鸯鸭的时候要注意很多问题,它不像普通的鸭子那样养殖比较简单,有些方面区别较大的。那么养殖的时候要注意哪些问题呢?鸳鸯鸭养殖前景如何?下面就来了解一下。

鸳鸯鸭养殖注意事项有哪些?

选址:鸳鸯鸭对于水的需求比较高,所以选择地址的时候要优先考虑水的位置,水利条件好,养殖优势就大。以水源丰富且流通性大的地方为佳,水资源和水草要丰富一点,这样就有优质的先天条件。其次要有较长时间光照能直射到水源盘边的陆地上,周围避免有遮阴物,鸳鸯鸭尤其喜欢晒太阳戏水。由于养殖时

间一长,鸳鸯鸭活动场地容易有异味,所以风向要经过养殖场地,这就是选址时需要考虑的一些东西了。

养殖比例:养殖比例是指公鸭和母鸭的比例,这个是养殖户容易忽略的一个问题,虽然是鸳鸯鸭,但是公母的比例也不是一比一,一般是在一比三左右,这样利于繁殖,增加产蛋收益。其间不要輕易的补充公鸭,应该都是从小一起养殖的,如果要补充也是少量的补充,一次性补充过多容易导致鸭群出现动乱,这个要多注意。

病害预防:虽然鸳鸯鸭本身抗病害的能力偏强,但是不代表鸳鸯鸭就不会得病,不少人会很

自然的忽略这方面的问题。其实它们的病害和普通的肉鸭一样,但是诱发病害的原因不一样,鸳鸯鸭大多数情况下基本都是因为卫生不注意诱发的,极少数的情况下才会因为其他原因诱发。所以鸳鸯鸭预防病害的方式很简单,做好日常的鸭舍消毒就好了。

及时分群:养殖鸳鸯鸭时虽然可以大规模的养殖,但是它每群的数量不宜太多,普通的鸭子可能几千只一起养殖问题也不大,但是鸳鸯鸭的话一群也就一两百只左右,不宜太多。鸭舍也需要按群分区域,这样养殖的效率会明显的增加的。鸭舍的面积按数量来,冬季密集一点在4-6只每平米,夏季的话稀疏一点,在

3-4只每平米,如果条件不够,密度适当大一些也没关系,但是分群要及时分好。

鸳鸯鸭养殖前景如何?

鸳鸯鸭是一种特种禽类,比家鸭的经济价值还高,国内外都非常重视,这种鸭子的价格比普通家鸭价格要贵2-3元一斤,养殖效益十分可观。

饲料利用率高,产肉性能好,鸳鸯鸭在产蛋高峰期,每天吃干料不超过150-160克,而且生长速度快,10-11周龄即可上市,成年公鸭活重可达4-6公斤、母鸭可达2.5-3公斤。一只鸭子就可以赚一百多块,利润十分不错。

鸳鸯鸭肉味鲜而香,骨质比较脆软,有野禽独特风味,营养丰富、瘦肉多,深受消费者的欢迎,市场需求一直处于供不应求的状态。

(据《家禽养殖网》)

面向/郊区 服务/农业 做/农民/的/朋友

第四十三期

宠物饲养与市民健康

主办单位: 东方城乡报社 上海市动物疫病预防控制中心 上农APP

鼠疫抬头,请密切警惕您家的猫咪和狗狗

很多犬猫主人提出“我们家的狗猫经常抓耗子,会不会感染鼠疫?”的问题,狗猫将自毙的染疫动物叼食回家,如果这些动物本身就是感染了鼠疫的动物,将极大增加被感染的风险。此外,狗猫在野外散养也会增加其自身被跳蚤叮咬感染鼠疫的风险。

一、什么是鼠疫?

鼠疫是鼠疫耶尔森菌借鼠蚤传播为主的烈性传染病,系广泛流行于野生啮齿类动物间的一种自然疫源性疾。我国境内主要以西北部地区有散发病例发生,人类感染鼠疫的主要症状为呼吸困难、咳嗽、高热、淋巴结肿大、出血等。鼠疫属国际检疫传染病和我国法定的甲类管理传染病。

二、鼠疫和猫咪狗狗有什么关系吗?

鼠疫是能够由老鼠传染给猫咪狗狗的,主要通过以下两种方式:

当猫咪和狗狗被跳蚤叮咬,而叮咬它的跳蚤恰好携带鼠疫耶尔森菌时,它们就有可能被传染上鼠疫。

当猫咪和狗狗捕杀携带鼠疫耶尔森菌的老鼠时,它们就有可能被传染上鼠疫。

当猫咪和狗狗发生鼠疫时,会通过以下两种方式传染给人类:将携带鼠疫耶尔森菌的跳蚤带入家中间接传染人类;发病后直接传染人类,特别是猫咪。

三、猫咪和狗狗发生鼠疫时有何症状?

鼠疫是一种严重的全身性疾病,主要以侵害淋巴系统和肺为特征。临床表现高热、衰竭、出血倾向、意识模糊、头痛及四肢剧痛、局部淋巴结肿大等症状。

狗狗的抵抗力较强,感染鼠疫并不多见,而且感染以后常呈一过性表现,死亡率比较低。但狗感染后可以带菌,成为危险的传染源。

猫咪发生本病的概率比狗狗高很多,症状主要为咳嗽、发热、淋巴结肿大,严重的可能会发生肺炎和败血症。

四、如何预防猫咪和狗狗发生、传播鼠疫?

预防鼠疫关键要避免宠物接触到老鼠

和跳蚤这两个媒介动物,因此:

防止宠物直接接触到跳蚤。定期给宠物驱虫,外出游玩可能钻草丛时,要提前给狗狗使用能主动驱避跳蚤的喷剂;

防止宠物间接接触到跳蚤。避免宠物与流浪猫流浪狗接触,不要到它们常出没的地方遛狗。

防止宠物直接接触到老鼠。灭鼠工作要做好,尤其是发现老鼠屎等鼠类活动痕迹时;

防止宠物间接接触到老鼠。宠物的食盆水盆、狗粮猫粮、狗窝猫树等避免接触到老鼠;

如果宠物发生类似上述鼠疫症状,尤其是淋巴结肿大时,请立即带宠物去宠物医



院,同时带家人去医院以确诊/排除鼠疫风险。

在部分地区鼠疫离人类并不遥远,但对于我们绝大多数人又并不是那么容易被传染,鼠疫可防可治,并且我国的医疗条件足够应对鼠疫,尽早使用抗生素的治愈率非常高。

执笔: 朱晓英 龚国华 赵洪进
插画: 宋雨迪