

东方城乡报

三农实用周刊

面向郊区 服务农业 做农民的朋友

[实用技术]

冬季养鹅的注意事项

冬季养鹅的利润是高,但冬季养鹅也会比其他季节养殖困难,因为要注意的细节太多了,那么怎样才能更好地确保冬季养鹅呢?下面就带大家一起来了解一下。

如何降低冬季养鹅的风险?

做好保暖:成年鹅虽有一定的抗寒能力,但对于母鹅的繁殖性能也有一定的影响,所以养殖户们务必要抓好防寒保暖措施,并保持好干燥温暖,控制好室内温度在5℃以上。有条件的可搭盖塑料暖棚,利用太阳能增加室温,可使母鹅产蛋率提高15%以上。

定量喂料:鹅在冬季自身消耗增加,因其吃的饲料要消耗一部分热能来御寒。因此,产蛋母鹅的饲料营养标准要提高,精粗搭配要合理,以平衡鹅体的消耗,增强其御寒能力。

不能断青料:产蛋母鹅更不能断青料。实践证明:种鹅在产蛋期不喂青料,产蛋率下降50%,如果日粮不断青料,每隔一天就产一个蛋,产的蛋大而重,产蛋母鹅每天要不少于500克青料。

增加运动:冬季母鹅活动量减少,为防止鹅体过肥,也要加强运动,增强体质,也有助于母鹅产蛋。

提供饮用温水:鹅在冬季消耗的热量多,不宜给饮过冷的冰雪水,无论白天夜晚都应给饮温水,以减少体能的消耗。

(据《畜牧养殖》)

冬季猪瘟该如何防控?

在猪的养殖过程中,养殖户们很不想遇到的糟心事就是发生猪瘟,如果预防和防治不及时、不到位的话,很有可能会给猪带来大面积的损伤,给养殖户们也带来极大的经济损失。那么冬季猪瘟该如何防控呢?

每当换季时使用瘟毒血抗和清瘟败毒散拌进饲料连续半个月进行预防。如果发现病猪,应该立即将病猪隔离,使用碘制剂将猪群猪舍进行消毒。对病猪注射瘟毒血抗和博客的混合注射液,在饮用水与饲料里加入小苏打,粪便正常后可以让病猪喝点多维。在一个星期时按治疗量使用菌肽诺与瘟毒血抗,需使用半个月预防量。

及时接种疫苗

给猪接种猪瘟疫苗,接种后观察3天,以免猪出现昏厥、呕

吐等现象,特别是要对母猪进行接种来规避猪瘟,猪仔则通过初次的哺乳来进行,在效果即将失去时进行第二次接种。另外不要把生猪和猪仔混养,避免病菌的传染。

注意卫生消毒

预防猪瘟最重要的一点就是要注意猪圈的卫生环境,要对猪圈内外彻底消毒,例如猪圈、垫草、水槽、粪水、用具、容器等进行消毒处理;并进行定期消毒,可用火碱、漂白粉、生石灰等进行混合并喷施消毒。



做好隔离

做好隔离工作,避免病猪进入猪圈,并做好检疫工作,以免大范围传染,消除猪瘟隐患。对病死猪要宰杀并深埋,严禁出售和食用。

加强管理,科学养猪

在冬季更要重视饲料喂养的质量,给猪提供更合理的高质量营养丰富的猪食,提高抗病能力,经常通风以保持猪舍内空气清新。(据《养猪技术》)

牛拉稀的原因及防治方法

在养牛的过程中,可能因为天气原因,因为饲料问题,因为着凉等等问题,很有可能会导致牛拉稀,就会影响牛的生长情况,那么引起牛拉稀的原因有哪些呢?又该如何防治呢?

引起牛拉稀的原因

霉菌性拉稀:牛饲喂发霉饲料极易引起霉菌性胃肠炎。病牛精神萎靡,食欲减退,反刍减少甚至停止,持续拉稀,粪便恶臭,混有泡沫、黏液和血液,但体温不升高,使用各种抗菌剂治疗无效。

中毒性拉稀:牛饲喂过酸的青贮料、酒糟,易引起胃胃酸中

毒。病牛精神沉郁,结膜呈淡红色,食欲减退甚至废绝,目光呆滞,步态蹒跚,后肢踢腹。严重者卧地不起,磨牙呻吟,肌肉颤抖,呈昏迷以至虚脱状。初期排灰色稀粪,继而转为绿色泡沫状水泻,如不及时治疗就会便血死亡。

不洁性拉稀:牛由于采食脏物、污水,极易引起细菌性胃肠炎。病牛精神沉郁,体温升高,食欲、反刍减少甚至废绝,持续拉稀,初期排粪如喷射状,后期排粪乏力,粪中混有泡沫、黏液和血液。

草食性拉稀:牛采食过多的

刚萌芽的嫩草或青料,导致胃肠道功能失调而引起下泻,粪便稀薄呈青绿色,病牛精神、食欲良好,体温正常。

过劳性拉稀:耕牛整日卧地,疲惫乏力,食欲减少或废绝,长期持续拉稀,粪中混有泡沫、黏液和血液,但体温不升高。

如何防治牛拉稀?

降低含水量:合理进行饲料和水分给量的搭配,青饲料较多时,就每天多喂些青草,要么就增加甘草,经过2~3天,就能改善牛拉稀的状况。但是在饮水这一方面,也尽量给牛饮用温水,并且伴

随着一些治疗腹泻的药物。

合理搭配饲料:合理的搭配精饲料和粗饲料,并且能在饲料中添加改善牛腹泻的药物,来助力消化药物,提高饲料的转化率,同时也能尽快的改善牛拉稀。

确保饲料的卫生:要放弃霉变的饲料,因为严重被污染,里面有很多有害物质,并且在放弃这些饲料同时,添加防止霉变的添加剂,让牛的腹泻尽快改善。

定时驱虫:有一些养殖场的牛,可能是因为没能及时给牛驱虫导致牛出现腹泻,这可能就是寄生虫刺激牛消化道的原因,所以大家要解决的方法就是,给牛进行定期驱虫,预防解决牛拉稀的问题。(据《农村养殖网》)

面/向/郊/区 服/务/农/业 做/农/民/的/朋/友

第六十九期



宠物饲养与市民健康

主办单位: 东方城乡报社 上海市动物疫病预防控制中心 上农APP



养犬需防“螨虫病”

狗狗容易感染螨虫,如何有效预防螨虫感染,这是宠物主人要了解的常识。犬感染螨虫后,会引起皮肤过敏、瘙痒、抓挠、舐咬,然后可能出现水肿、丘疹、结节、脓疱,常导致皮肤损伤。如不及时治疗,可能会继发引起皮肤细菌、真菌继发感染,产生严重的皮肤病。所以早发现、早治疗很重要。犬或猫身上的螨虫也能感染人,所以预防各类螨虫感染显得较为重要。

常见感染螨虫的种类

疥螨:犬疥螨寄生于犬皮肤内,是一种接触性传染性皮肤病。显微镜下观察犬疥螨近圆形,微黄白色,背面隆起,腹面扁平,虫体分为头和躯体两部分,腹面有四对粗短的足,主要是接触传播感染,螨虫生活在犬体表皮内,并在内产卵、生长发育。此病多发于秋季、冬季和春初,在阴雨季节和饲养管理卫生条件差时容易蔓延传播。

疥螨属真螨目,疥螨科是一种永久性寄生螨类,也可寄生于人和其他哺乳动物的皮肤表皮层内,对人引起一种有剧烈瘙痒的顽固性皮肤病。疥螨生活史分为卵、幼虫、前若

虫、后若虫和成虫五个期,疥螨寄生在人体皮肤表皮角质层间,啃食角质组织,并以其螯肢和足附节末端的爪在皮下开凿一条与体表平行而迂曲的隧道,雌虫就在此隧道产卵。

蠕形螨:蠕形螨寄生于犬的毛囊和皮脂腺内所引起的常见而又顽固的皮肤病,犬猫感染病例中以大多见,且危害严重。犬之间通过直接或间接接触而相互传播。3~6月龄的幼犬最易发生。感染了蠕形螨时会出现以下情况:皮屑增多,感觉狗狗身上皮屑总是特别多,不管洗澡的频率是多还是少,都会出现特别多皮屑;毛发脱落。当蠕形螨量增多时破坏毛囊导致毛囊坏死,掉毛;皮肤发红、脓疱;皮肤增厚;瘙痒。

耳痒螨:耳痒螨多寄生于犬、猫的外耳道,是猫和犬常见的耳道寄生虫。显微镜下呈椭圆形,口器为短的圆锥形,4对足,主要感染是通过直接接触传播,犬、猫之间也可相互传播。耳螨在猫和犬之间的传染性很高,可以通过近距离接触传染。家里的一只猫或犬感染耳螨,所有猫和犬都有可能感染,所以需要同时进行治疗。虽然耳痒螨任何年龄的犬

和猫都可能被感染,但临床上以幼年犬猫发病居多,猫比犬更容易被感染发病。

姬螯螨:姬螯螨是皮肤表面寄居的螨虫,寄生在宿主的表皮角质层,在皮屑形成的假隧道内快速移动,会定期用螯针刺入表皮,将自己牢牢固定在皮肤上,吸取无色透明的体液。姬螯螨的虫卵与虱子卵的形态接近,二者都是与毛干相连,区别在于姬螯螨虫卵较小,被细纤维束捆绑在宿主的毛干上;而虱子卵较大,被胶粘在毛干上。姬螯螨是高度接触传染的寄生虫,尤其在幼年动物之间。。

如何有效预防螨虫感染?

加强饲养管理和清洁卫生是有效预防螨虫病的有效方法。平时使用除螨药用香波,除被毛污物的清洁功能外,还能防治各种皮肤病与外寄生虫病。春季用驱外寄生虫滴剂,可以预防性杀灭跳蚤和螨虫。

螨虫会产生虫卵,许多杀螨剂对虫卵的杀灭作用较差,故应重复用药1~2次。注意螨虫可感染人,兽医及宠物主人也要注意个人防护。



常见治疗螨虫方法

如果发现各种螨虫感染应及时治疗,治疗时应先患部剪毛,用温肥皂水刷洗患部,除去污垢和痂块,再用药局部涂搽、喷洒,口服或注射相关抗螨虫药物。当全身发生瘙痒,应以杀螨药和抗过敏药同时使用。出现脓疱或脓肿,则应同时配合使用抗生素药物,同时增加宠物的维生素和矿物质的补给。对可能螨虫污染环境,也要用各种杀螨虫产品对环境进行杀螨虫处理,防止环境中长期螨虫生存。

执笔:夏炉明 龚国华 赵洪进
插画:袁梓涵