


夏日炎炎，宠物中暑怎么办？



网络资料图

宠物正常的体温，通常维持在37.8℃~39℃之间，当外界的温度过高，导致宠物核心温度超过41℃时，内脏器官开始受损，宠物就中暑了。

宠物中暑的症状

轻度中暑。烦渴、发热、喘息、唾液黏稠、心跳加快。

中度中暑。四肢无力，舌头伸得特别长（可能因缺氧发紫）；全身毛发会舔得潮湿；皮肤灼热，体温达40℃以上；腹部无毛部位皮肤出现潮红，泛出血点、血斑；蹒跚踱步且无精打采。

重度中暑。四肢痉挛、倒地抽搐或昏迷，中枢神经功能障碍，肝胆、肾脏、血液、肌肉等功能发生障碍，最终可导致器官衰竭、死亡。

哪些情况容易中暑

通常以下这些环境容易导致宠物中暑，所以有心的宠物主们，在炎热的夏天千万不要让宠物独自待在这样的环境里，或者让宠物们长时间在这样的环境里活动。

阳台和车厢。阳台通常会暴露在外面对太阳的直射，温度会很高；对于封闭的阳台

和车厢，因为有温室效应，加上室外暴晒，温度可上升到45℃以上，这对于宠物们就是极其恶劣的环境，只要十几分钟，宠物就会因为体温升高和脱水而死亡。

即使在春秋季节，如果车里不通风，18℃以上的气温就有可能让狗狗在车里中暑。

高温天外出。身材矮小的狗子比人类贴近地面得多，在室外温度达到32℃的时候，由于热辐射的关系，狗子感受到的温度是多少呢？38℃！所以当人类都感到被热浪折磨的时候，狗狗承受的痛苦要大得多。此外，被太阳暴晒过的地面，高温也会烫伤宠物的脚丫子。

剧烈运动。高温下千万注意，别让宠物们做剧烈运动，即使是不容易中暑的狗子都会非常危险。有的宠物一出来就很兴奋，跟小孩子一样，跑跑闹闹玩个不停，过不了多久就会呼吸困难，加上天气炎热，加大了宠物中暑的可能性。

太空舱猫包。这个原理跟封闭的阳台和车厢类似，因为太空舱猫包不通风，闷热，会产生严重的温室效应，全透明的塑料材质更有可能引发胆小猫咪的应激反应。

此外，还有人群密集的高温环境，也容易导致宠物们中暑。宠物主们在夏天，尽量避免带着宠物去这些地方。

哪种狗狗容易中暑？

有些狗狗会更容易中暑，大家要注意一下，比如：

曾经中暑过的狗狗；中老年狗狗，或者幼猫幼狗；长毛皮厚的狗狗，如哈士奇、阿拉斯加、萨摩、秋田等；短鼻肥胖的品种，如八哥、斗牛、西施、波士顿梗等；大头小眼的狗狗，如松狮犬、沙皮狗等；金毛，拉布拉多等容易得心脏病的狗。

中暑的急救措施

先解开宠物的颈圈、胸带或者其他包裹、悬挂在宠物身上的物品。

立即移到阴凉通风处，可以用扇子、报纸、衣服等扇风保持空气流通。同时，用空调、风扇等降低宠物体表和环境温度，将宠物双脚抬高，加快血液流动。

准备充足的饮用水，可以及时补充水分，保证宠物充足饮水。但不要强行喂水，防止

宠物在意识不清的情况下呛水，引发窒息。

可以在宠物的脖子、四肢、腋下等地方，用冷水浸湿的毛巾擦拭降温，或者用冷水直接浇湿身体降温，切记不能用冷冻水，防止体温骤降，引起更严重问题。因为这会导致外周血管收缩，血液被迫流回器官中，这样一来机体会觉得冷，然后反应性地想让身体升温。

除了以上步骤外，还可以用酒精擦拭宠物肉垫、耳后等部位进行降温，毛巾裹住冰袋或湿毛巾冷敷，保持呼吸畅通并立刻送往就医。

在紧急治疗过程中，要随时注意宠物的体温，当体温降至38℃时，就应该停止一切散热的动作，以免过度散热造成低体温，若送医过程中如出现呼吸中止、休克现象时，应及时进行心肺复苏术。

在实施临临时应对措施后，很多主人认为宠物抢救过来以后就是没事了，但是中暑会引起一系列的身体损伤，包括产生后遗症，必须带去医院做详细的检查。

（来源：“PETOWARDS”微信公众号）



宠物饲养与市民健康

第132期

主办单位：东方城乡报社 上海市动物疫病预防控制中心 上农APP

布偶猫饲养及注意事项

□夏炉明 龚国华 赵洪进

布偶猫是猫科动物中有特色的品种之一，被称为“仙女猫”，不仅长得好看还很惹人喜欢，它们有着大眼睛、柔软的毛发及可爱的外表，是一种受欢迎的家养宠物猫咪。

布偶猫特性

布偶猫又称布拉多尔猫，是猫中体型和体重较大的一种，布偶猫全身松弛，像软绵绵的布偶一样。布偶猫头呈V形，眼大而圆，被毛丰厚，四肢粗大，身体柔软，多为三色或双色猫。它们性格温顺、恬静，对人非常友善，对疼痛的忍受性相当强，常被误认为缺乏疼痛感。

布偶猫性格比较温柔，待人非常好，在很多人眼里布偶猫就是个很乖的宝宝，还对主人很忠诚，布偶猫在家养来陪伴老人和小孩，尤其对小孩特

别好。布偶猫的毛发非常长，手感非常顺滑和柔软，它的毛不止一个颜色，还搭配了别的颜色。由于布偶猫的性格比较安静，很适应公寓生活。同时，布偶猫也需要主人的关注和爱护，要求主人经常和它们互动，以增进彼此的感情。

布偶猫的饲养注意点

选择合适的猫粮。布偶猫的肠胃特别脆弱，很容易拉稀、呕吐等，所以饲养布偶猫一定要注重它的肠胃护理。猫粮的挑选要求质量较好，营养符合生长发育要求。给它们提供足够的新鲜干净饮水。

根据年龄对布偶猫进行喂食。在幼猫的食物中必须含有蛋白质、脂肪与维生素，可选择给它喂食羊奶、奶糕以及幼猫粮。成猫时期除猫粮外可喂食冻干、罐头等，按少食多餐的原则进行喂养。

准备猫抓板。布偶猫跟其

他猫咪一样，是需要磨爪子的，给布偶猫准备好猫抓板，让布偶猫从小就养成在猫抓板上磨爪子的习惯。给它们提供足够的玩耍空间，布偶猫需要足够的空间来玩耍、活动，因此应为它们提供一个舒适的活动空间，以增强它们的活力。

接种疫苗和驱虫。布偶猫需要接种的疫苗有猫三联和狂犬疫苗。定期驱虫，虽然布偶猫都是在室内饲养的，但不能忽略驱虫工作，建议每3~4个月进行一次体内驱虫，每2~3个月进行一次体外驱虫。

注意观察布偶猫日常行为是否有异常。布偶猫的忍耐能力非常强，得病后可能没有明显的表现，所以要多观察它们的身体变化。观察猫咪的毛发，如果毛发不再顺滑，可能是因为它们生病了；观察猫砂盆中猫砂结团的情况，大小、数量是否与往常一致，粪便的形状是否正常；观察猫咪的精神面貌，是否出现食欲不振、不爱玩



插图：袁梓涵

耍的问题，发现有异常情况，及时咨询宠物医生。

布偶猫护理要求

布偶猫属于人工培育的品种，对环境有一定的要求，饲养时需保证环境的稳定性，不宜经常更换住所，还需保证生活环境的干净卫生。布偶猫需要一个安静的环境，以便能够安心地玩耍、休息和睡觉。由于

布偶猫比较脆弱，应避免与外界接触，以免受到伤害。布偶猫的毛发和肌肤需要定期的清洁和护理，以确保它们的健康。因此，应定期给它们洗澡。布偶猫因为肠胃比较差，容易拉稀，便便就容易沾到毛发上，所以主人最好就1~2个月给布偶猫洗一次澡，但是不能太过频繁，不然会导致布偶猫毛发粗糙。