

宠物老年时代 如何提供贴心关怀？



网络资料图

中国宠物经济经过了多年的高速发展，宠物数量和宠物渗透率快速增加，这使得宠物老龄病问题开始凸显，铲屎官们在实现“家有萌宠”的生活目标后，开始不得不面对宠物老龄病带来的新挑战。

宠物进入老年后，生理和心理会出现一系列的变化：比如，宠物会出现关节问题、视力和听力下降、免疫系统减弱以及更容易患疾病。在这个阶段，宠主面临最大的挑战是如何更好地照顾宠物，包括适当的营养需求、医疗护理、适当的

运动和锻炼以及陪伴等。此外，定期体检筛查也是老龄宠物健康管理的关键部分，可以帮助尽早发现和处理健康问题，从而延长宠物的寿命和提高其生活质量。

中国宠物老龄化现状

如何界定宠物进入老年？对猫猫来说，一般年龄在10岁以上就算进入老年期了；对犬来说，因为体型差别较大，通常体型较大的犬较早进入老年阶段。比如，小型犬在12岁左右进入老年，大型犬满8岁就被认为进入老年阶段了。

当前，市场上对中国宠物

老龄化现状存在两个口径的判断：

据 DIAMOND online 报道，在中国，狗平均年龄为2.7岁、猫为2.2岁，预计未来十年，中国老年宠物的数量将迎来爆发。

而亿欧智库在《2023 中国宠物行业新趋势洞察报告》中称，2022年中国有1.05亿只宠物猫和狗，其中超过20%已经达到老龄化标准，预计到2025年，这一比例将上升到30%，至少约有3150万只老年宠物。

虽然宠物老龄化到来的时间存在分歧，但无疑宠物老龄化都是一个确定的趋势。

胃肠疾病最常见

在更微观的层面上，企业可以提供更清晰的视角。宠物医疗行业巨头新瑞鹏对旗下分布在全国100多个城市的1000多家宠物医院的宠物就诊数据进行分析。分析发现，就诊猫咪数量远多于犬，就诊犬已经呈现出明显的老龄化趋势。此外，无论猫犬，雄性宠物就诊数量都高于雌性。

在犬、猫就诊原因中，最常见的就是胃肠疾病；针对老年宠物，特别是猫咪来说，慢性病开始出现苗头，中老年猫最多

的就诊原因就是慢性肾病和胃肠炎；中老年犬就诊原因最多的则为胃肠炎和外伤。

定期体检是关键

在饮食方面，老龄动物与人类相似，应以高蛋白、高纤维和低脂肪饮食为主，高糖高脂的食物容易造成犬猫过度肥胖，不仅会加重心血管、肌肉关节负担，还是心脏病、糖尿病、胰腺炎等疾病的诱因。

要想犬猫健康长寿，一口好牙是关键。如果犬猫能够接受主人进行洁牙，可以在家选择宠物漱口水、磨牙棒、宠物牙刷等工具进行洁牙；如果宠物抗拒，可以向专业的宠物医院寻求帮助。

定期体检。对于6岁以上的犬猫，建议每半年或一年进行一次全身体检，主要检查牙齿、心脏、肝肾等组织器官的健康状况。只有定期了解宠物的身体状态，才能预防疾病发生，更好地照顾它们。

宠物跟人一样，随着年龄的增长，出现一些健康方面的问题在所难免，作为宠物家长，了解和掌握一些宠物健康知识，健康科学养宠才能让宠物们陪伴我们更长更久。

(来源：宿迁网、龙昌小宠)

狗狗也有自己专属的电视节目

DOGTV 是2012年在美国开通的一个24小时的宠物狗电视网络，节目包括放松音乐、运动训练和视觉刺激等，旨在提供适合狗狗观看的娱乐内容。

在工作日，DOGTV 播放一些轻松的犬类玩耍视频，旨在缓解狗狗因没有主人陪伴而产生的焦虑情绪。而在双休日，DOGTV 还特别推出了适合狗狗和主人一起观看的节目，让他们能够共度美好时光。

狗狗对于电视节目的兴趣并不亚于人类，他们会对屏幕上的画面产生兴趣。因此，DOGTV 的内容十分重要，为了让狗狗更好地理解 and 欣赏电视节目，制作团队根据狗狗的视觉特点进行了精心的调整。狗狗对颜色的识别能力较差，所以节目的颜色以黑、白、灰和深浅不同的蓝紫色为主，以便狗狗更清晰地辨认画面。

此外，DOGTV 的节目时长也很短，每个节目只有3~6分钟。这是因为狗狗的注意力持久性较低，长时间的观看会使他们产生疲劳和无聊的感觉。

(来源：宠物志)



宠物饲养与市民健康

主办单位：东方城乡报社 上海市动物疫病预防控制中心 上农APP

第154期

猫也有免疫缺陷病毒病？

□李增强 龚国华 盛文伟

何为猫免疫缺陷病毒病？

该病是由猫免疫缺陷病毒引起的一种表现猫免疫缺陷综合征的疾病，是以容易继发感染为特征的病毒性传染病。临床上以免疫功能低下、呼吸和消化系统炎症、免疫系统和神经系统功能障碍为特征。该病流行广泛，以中老年猫多发。由于该病原的生物学特性和感染猫的症状与人的艾滋病相似，故又称猫艾滋病。

猫免疫缺陷病毒病流行特点

猫免疫缺陷病毒又称猫嗜T淋巴细胞病毒，在分类上属反转录病毒科、慢病毒属、猫慢病毒群。同其他反转录病毒一样，猫免疫缺陷病毒对热、脂溶剂、去污剂和甲醛敏感，蛋白酶能够去除病毒粒子表面的部分糖蛋白而使其丧失感染性，病

毒对紫外线的抵抗力较强。

猫免疫缺陷病毒可经感染猫唾液排出，唾液中的病毒滴度较高。实验研究显示含病毒唾液可经皮下、肌肉、腹腔或静脉接种而感染动物，并在接种后很快就能从感染动物血液和唾液中分离出病毒。一般情况下，猫和猫的打斗、咬伤为该病的主要传播途径，也可发生水平传播、母猫与仔猫之间垂直传播。猫免疫缺陷病毒与其他慢病毒一样，具有严格的宿主特异性，不能感染犬、小鼠，但可感染狮子、老虎、非洲豹。

据报道，世界各地健康猫的免疫缺陷病毒抗体阳性率通常在1%~15%，且分布广泛。该病毒已经存在很长时间，成年猫中抗体常见，以5岁以上猫的血清阳性率最高，公猫的抗体阳性率比母猫高2倍，群养猫的阳性率高于单养猫，杂种猫高于纯种猫，流浪猫高于家养猫，这意味着流浪猫感染阳性率最高。

临床症状

猫免疫缺陷病毒感染的潜伏期很长，猫感染后表现临床症状之前，潜伏期可达5~10年，感染后可造成猫的免疫功能低下，使其更易遭受各种病毒、细菌、真菌、寄生虫的侵袭。抗生素治疗在多数情况下只能缓解症状，不能根治疾病。

患猫发病后临床表现腹泻、体重减轻、发热、严重牙龈炎、慢性口炎、慢性上呼吸道疾病、消瘦、淋巴腺病、贫血、慢性皮肤病、慢性结膜炎、慢性腹泻和神经症状等。有些病例黏膜发生溃疡和坏死，末期发生肿瘤性疾病，如淋巴瘤和白血病。该病毒是一种慢性病毒，与人类免疫缺陷病毒特征相似。虽然该病毒目前并不会感染人体发病，但对那些患有免疫缺陷疾病的饲养人员，应引起重视。



插图：袁梓涵

防治措施

治疗方法。该病目前没有有效的药物，且现有的慢病毒疫苗无法有效保护猫科动物。针对患猫治疗，通常是为了控制继发细菌感染，用抗病毒药物可能会有一些临床治疗效果。

免疫隔离方法。控制该病发生主要采取隔离措施。要防止健康猫与感染猫接触，限制猫自由出入。要防止健康猫和

野猫或流浪猫接触，引进猫时应进行猫免疫缺陷病毒感染检测，条件允许时隔离饲养6~8周，只有抗体阴性猫才可领养或入群。

控制流浪猫。预防本病尽量减少流浪猫的数量，减少家猫在室外逗留的时间，防止猫之间发生撕咬和打斗。

加强饲养管理。保持猫的饲养环境以及饮食用具的清洁，经常消毒，并且避免使用公共饮食用具。