

第一批回家过年的狗狗 已经吐晕在车上了

长途旅行携带宠物狗攻略

据说今年第一批回家过年的狗子已经吐晕在车上了。胃里翻江倒海,狗子精疲力尽,前一秒它还在干呕,下一秒“哇”一下变成喷射战士……坐个车就像经历了一场浩劫。那么,假期带着狗狗旅行应该怎么做呢?

还没带狗启程的主人们先不要慌,狗狗晕车是一件很常见的事。车内空气不流通、车辆行驶不稳等因素,都会让狗子在乘车过程中不适。具体症状可表现为:不停舔嘴唇、流口水、打哈欠,严重者甚至呕吐、发抖。

预防的办法就是在出行前几个小时,尽量不要给宠物喂食。在旅行过程中根据宠物的状态少量地、有规律地喂水喂食。如果有条件,还可以带些冰块。冰块的效果比让它吞下大量的水的效果要好得多,同时,又可以吸引它的注意力,让它保持忙碌的状态,从而使症状得到缓解。如果你的狗狗不习惯乘车旅行或被装进笼子,那可得在旅行之前就逐步进行训练。先尝试进行些短途旅行,并对它予以鼓励。

另外,如果事先知道你的

宠物会晕车,那么在出行之前去宠物医院买一些晕车的药物,这对它的不良反应会有一些的缓解。

不要让狗狗贴着窗户。狗狗是最喜欢把头伸到车窗外的动物,它们喜欢风吹动毛发的感觉,喜欢观察没有见过的世界。虽然剥夺它们这种乐趣是件很残忍的事,但是,确实是有太多的狗狗由于杂物、飞虫进入眼睛、鼻孔或气管而受到伤害。

如果狗狗直接吸入大量的冷空气,它们的鼻子和呼吸道也会受到损伤。更有甚者,有的狗狗还会触及电动车窗开关,有很多车型后排车窗没有防夹功能,这样一来狗狗会被卡死。所以,还是让它们老老实实地呆在车内吧。

注意冷暖变化。宠物不会告诉你它感觉热还是冷,所以要时刻留意气温的变化。如果,我们穿上了夹克,那么宠物

也有可能需要盖个毯子。在炎热的天气里,打开车窗或空调,可以防止它们温度过高或脱水。此外,直射的阳光会对深色的宠物造成更大的伤害,如果你的车窗没有贴膜,那么就该考虑带个遮阳篷。

不要把宠物或孩子单独留在车内。尤其是在夏季,即使车窗是开的,车内的温度也可能很快升到致命的程度。如果你需要补给或吃点东西,尽可能带着宠物一起去。如果条件不允许,就让同伴在你外出期间带着宠物四处遛遛,或一起呆在车内。

避免中毒和窒息。有些狗狗会吃任何能吃到嘴里的东西。当你在前排座位就餐的时候,注意不要随手就把一些对它们有危害的食物喂给你的宠物,如巧克力、坚果、葡萄或葡萄干。同时,还要小心那些能造成狗狗窒息的东西,如硬币、袜子和小玩具。另外,如果它



网络资料图

们在车上吃下的是机油、螺丝螺母一类的东西,即使是微量,也可能导致死亡。

有规律地休息。宠物和你一样,需要舒展筋骨、活动腿脚,而且可能所需的时间是你的两倍。宠物每隔一段时间就要喝水、走动或排泄。当你吃饭的时候,让狗狗躺在餐桌下面,并不算是让它休息。在它跳回到车里之前,一定要给它真正意义上的放松。而且,给宠物休息时间的同时,也是给你自己时间欣赏沿途的风光。

当你打算离开车子的时候,打开车门之前,哪怕只是要打开一秒钟,也要确保宠物是否已经被拴牢或者绳子拿在你

的手里,这主要是因为宠物在打开车门后会向外冲。如果你停车的位置在大街上,置身于车水马龙马路上,它们这样的行为可能是致命的。所以在开门之前一定要注意,记得固定好你的宠物。

想带着自己心爱的宠物长途旅行的话,你需要注意很多的地方,这些在你平时跟它们相处的时候可能没有注意过,但是宠物是我们的朋友,它们的健康和安危也是我们所需要关注的,所以下次长途旅行之前,尽量周全地为它们着想,这样旅途中会增加更多的乐趣。

(来源:荔枝新闻、“每日一狗”微信公众号)



它们和我们

第158期

宠物饲养与市民健康

主办单位: 东方城乡报社 上海市动物疫病预防控制中心 上农APP



插图:宋雨迪

□陈伟锋 龚国华 盛文伟

目前,城市流浪猫的数量不断增加,居民在生活的小区不时会看到流浪猫的身影,特别是晚上传来的流浪猫发情和打斗的叫声,严重干扰了居民正常休息。流浪猫数量不断增加的主要原因是不少小区爱心人士关心流浪猫,不断给流浪猫投喂各类食物,流浪猫繁殖力增强,引起小区流浪猫的数量持续增长,这些现象引发严重的人猫矛盾和居民与居民间的矛盾。同时大量流浪猫咪也更容易相互之间传播疾病,有

些是人畜共患病,影响居民健康,所以控制流浪猫的数量,提高流浪猫的健康水平,是有效管理流浪猫的方法,目前大家公认的方法是对流浪猫采取TNR。

何为流浪猫TNR?

TNR是英语Trap-Neuter-Return的缩写,即抓捕-绝育-放归,通过该手段可以有效降低城市社区流浪猫数量,解决城市流浪猫与人类之间的矛盾,包括其由于未绝育而引起的发情嚎叫、打斗等扰民情况

您了解流浪猫TNR吗?

及数量过多所引发的潜在公共卫生安全问题。TNR可以在不影响猫咪的生活质量的情况下,有效地控制流浪猫的数量,同时保护流浪猫,提高流浪猫的健康水平。

流浪猫TNR如何实施?

流浪猫绝育TNR计划是通过流浪猫所在小区爱猫志愿者、有诊疗资质的爱心宠物医院和小区居委会、物业公司以及相关组织共同配合完成。

抓捕。爱猫志愿者先停止投喂流浪猫一天,然后在固定投喂点放置捕猫笼,笼内放置食物,诱导其进入后笼门自动关闭,即抓捕成功。捕猫笼也可直接放置在常见流浪猫的区域,由志愿者定期巡视、更换新鲜食物直至抓捕成功。警惕性、攻击性较强的流浪猫,使用投网抓捕。抓捕到流浪猫后,由志愿者将进入捕猫笼的流浪猫转运至宠物医院。在捕捉过

程中一定要注意安全,以免人或猫咪发生意外。

绝育。把捕捉的猫咪送到宠物医院,对其进行临床和实验室相关的必要检查和评估后,进行绝育手术。在绝育手术完成后且还在麻醉状态中剪去猫咪耳朵尖的一小角以做记号,用于日后辨识该猫咪已做绝育,通常公猫剪左耳,母猫剪右耳,同时根据猫咪的情况给绝育猫咪注射狂犬病和猫三联疫苗。

放归。在猫咪绝育和免疫后,根据猫咪的手术恢复情况,适当观察几天,通常公猫可以观察1天放归,母猫根据情况3~5天观察后放归。对一些亲人的流浪猫,可面对社会进行领养并登记收养者信息,保证其每年对猫进行免疫。对已完成免疫且未找到领养的流浪猫放归到最初的抓捕地点,继续由爱心人士定点喂食、喂水。

持续开展。持续开展流浪猫数量统计,以便监控TNR效

果,当一个小区内流浪猫的绝育比率达到70%左右时,就能做到有效控制流浪猫的繁殖和猫群数量稳定。小区志愿者发现有新的猫咪也需要继续对其进行TNR。

流浪猫TNR的作用

TNR项目可以有效控制小区流浪猫的过度繁殖,同时保障流浪猫可以安全、健康地在原区域继续生活,提高了流浪猫的福利水平。流浪猫绝育后打斗行为大大减少,使得因伤口感染而传染的疾病的传播得到有效控制,提高流浪猫健康水平,它们受到人为伤害的可能也将显著减少。同时,因流浪猫过多扰民而产生的社区矛盾也会大幅降低,实施区域内人猫关系得到改善,大大减少了虐待流浪猫的现象,对促进居民社区的精神文明和控制人畜共患病传播起到了关键作用。